

第3類医薬品

マキロン[®]かゆみどめパッチP 48枚入

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。

第3類医薬品

【効能・効果】 虫さされ、かゆみ、しもやけ
【成分・分量】 本品の膏体100g(1.25m²)中

ノンステロイド

鎮痒消炎薬 マキロンかゆみどめパッチP

⚠️ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)次の部位には使用しないで下さい。
傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、かぶれ👩 **相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状 |
|--------|-----------------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感 |
| 皮膚(患部) | 色素沈着 |

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

MADE IN JAPAN

使用期限

製造番号

| 成 分 | 分量 | はたらき |
|----------------|------|---------------------|
| ジフェンヒドラミン | 1.0g | かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤) |
| グリチルレチン酸 | 0.5g | 炎症をおさえます。(抗炎症剤) |
| クロタミトン | 5.0g | かゆみをおさえます。(鎮痒剤) |
| イソプロピルメチルフェノール | 1.0g | 殺菌作用があります。(殺菌剤) |

添加物：メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、*l*-メントール
貼付後ほてり(熱感)を感じるがありますが、ごく短時間のうちに消失します。【**使用法**】 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼って下さい。(使用法に関連する注意) (1)使用法を厳守して下さい。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。(3)外用にのみ使用して下さい。(4)汗をかいたり、皮膚がぬれていときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5)同じ場所に長時間使用しないで下さい。【**保管及び取扱い上の注意**】 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4)品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。【**包装**】 48枚(直径2.0cm×48枚)副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

お問い合わせ先 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

電話 0120-337-336

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

マキロンについて詳しくは、www.makiron-s.jp 02⑧登録商標

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10製造販売元
救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸破32-7