




貼るかゆみどめ

半透明
パッチ24
枚入り赤くはれた
虫さされ、かゆみにマキロン®
パッチエース

第2類医薬品 殺菌剤配合



- 水につよく、ムレにくい
 - お子様のかきこわし防止
- デキサメタゾン酢酸エステル配合



第一三共ヘルスケア



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸破32-7

G ©登録商標

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

▲使用上の注意

- ☒【してはいけないこと】 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないで下さい。(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし、たむし等又は化膿している患部(2)目の周囲、粘膜炎等(3)傷口、潰瘍(かきこわし)、ただれ、しっしん、かぶれ 2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。 3. 長期連用しないで下さい。

※相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が広範囲の人
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- | 関係部位 | 症状 |
|--------|--|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| 皮膚(患部) | みずむし、たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、かぶれ、色素沈着 |
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

虫さされによるかゆみに
マキロンパッチエース
(成分・分量)本品の膏体100g(1.25m²)中

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

成分	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	かゆみや炎症をおさえます。(抗炎症剤)
ジフェニドラミン	1.00g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤)
イソプロピルメチルフェニールトコフェロール酢酸エステル(ビタミンE酢酸エステル)	1.00g	殺菌作用があります。(殺菌剤)
	0.50g	血行促進作用により、皮膚の新陳代謝をよくします。

添加物: アジビ酸・アジニプロピル、メタクリル酸・アクリル酸・ブチルコポリマー、BHT、トメントール
 本剤は、副腎皮質ホルモン(ステロイド)のデキサメタゾン酢酸エステルを配合しています。

- (効能・効果) 虫さされによるかゆみ
 (用法) 1日1~3回患部に貼って下さい。
 (使用法に關する注意) (1)使用法を厳守して下さい。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3)外用にのみ使用して下さい。(4)汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5)数時間使用してかゆみが取ってくれば、本剤をはがして下さい。(6)同じ場所に長時間の使用はしないで下さい。

(保管及び取扱上の注意) (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(服用の原因になったり品質が変わります) (4)品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
 (包装) 24枚(直径2.0cm×24枚)

使用期限

製造番号



4 987107 606518

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931