

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第3類医薬品

関節痛・腰痛・神経痛の緩和に

# ノイビタ コンドロ錠

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム900mg (6錠中)・ビタミンE配合  
ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤

## ノイビタコンドロ錠の特徴

- 1.コンドロイチン硫酸エステルナトリウムは関節軟骨などに存在し、軟骨の弾力性や保水性を高め、関節のクッションのような役割をします。
- 2.ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>は関節痛・腰痛・神経痛を緩和します。
- 3.ビタミンEは過酸化脂質の生成を抑制し、血流をスムーズにして関節痛や筋肉痛を緩和します。



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

軟便、下痢

3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能・効果

1. 次の諸症状の緩和：関節痛・筋肉痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、神経痛、手足のしびれ、眼精疲労、便秘
2. 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時
3. 脚気  
「ただし、上記1及び3の症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい」

## 用法・用量

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	2回(朝夕)
15歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守して下さい。

## 成分・分量


本剤は、白色～帯黄白色のフィルムコーティング錠で、6錠中に次の成分を含有しています。

成分	分量
ベンフォチアミン(ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)	138.3mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	20mg
シアノコバラミン(ビタミンB <sub>12</sub> )	60μg
コハク酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	50mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	900mg

添加物：塩酸グルコサミン、セルロース、クロスカルメロースNa、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ステアリン酸Mg、酸化チタン、タルク、大豆レシチン、カルナウバロウ

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- (5) ビンの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- (6) ビンの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違っても服用しないよう注意して下さい。
- (7) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電話 0120-337-336  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標