

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビタミン含有保健剤

指定医薬部外品

滋養強壮・栄養補給・虚弱体質に

パント錠[®]

特 徴

パント錠はパンテチンを主剤とし、これにビタミンB₁、B₂、B₆、C、E およびニコチン酸アミドを配合した白色の糖衣錠です。

主剤であるパンテチンは、パントテン酸の誘導体として開発された薬剤です。パンテチンは体内で利用されやすく、補酵素（コエンザイムA）となって、体内の物質の合成や分解に関与します。

このパンテチンを主剤としたパント錠は、滋養強壮や肉体疲労・食欲不振および妊娠授乳期などの場合の栄養補給、ならびに虚弱体質に効果があります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
1カ月位服用しても症状がよくなる場合
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
下痢、軟便

効能・効果

- 滋養強壮
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- 虚弱体質

用法・用量

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2～3錠	1回
15歳未満	服用しないで下さい	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守して下さい。（他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい。）

成分・分量

3錠中

成分	分量
日局パンテチン	75mg (パンテチンとして60mg)
チアミン硝化物(ビタミンB ₁ 硝酸塩)	6mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	3mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	6mg
L-アスコルビン酸ナトリウム	150mg (ビタミンCとして133.4mg)
トコフェロールコハク酸エステル カルシウム	12.6mg (ビタミンEコハク酸エステルとして12.1mg)
ニコチン酸アミド	15mg

添加物：セルロース、無水ケイ酸、乳糖、トウモロコシデンプン、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、白糖、タルク、炭酸Ca、グリセリン脂肪酸エステル、カルナウバロウ

〈成分・分量に関連する注意〉

1. 本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビン(ビタミンB₂)が吸収利用されたのち尿中に排泄されるためです。
2. 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。なお、本剤はとくに吸湿しやすい製剤なので、服用のつどビンのフタをしっかりとめて下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. ビンの中の包装紙にくるまれた平型錠は乾燥剤なので、服用しないで下さい。
5. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電話 03 (6667) 3232

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

® 登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo

東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879番地