

使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないで下さい。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
 - ぜんそくを起こしたことがある人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 15歳未満の小児
- 次の部位には使用しないで下さい。
 - 目の周囲、粘膜等
 - しっしん、かぶれ、傷口
 - みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 連続して2週間以上使用しないで下さい。

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

製造番号

使用期限



使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬 第2類医薬品 **20枚入**
(5枚×4袋) 保湿チェック付

特徴

- フェルビナクを1枚あたり70mg配合した白色の鎮痛消炎シップ剤です。
- フェルビナクは痛みの原因物質(プロスタグランジン)の生成をおさえ、筋肉・腰・肩・関節のつらい痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- アルニカチンキがはれや炎症をやわらげます。

効能・効果

筋肉痛、腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

使用法

年齢	使用法
15歳以上	表面のライナー(フィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい。
15歳未満	使用しないで下さい。

- 〈使用法に関連する注意〉
- 1) 使用法を厳守して下さい。
 - 2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい。
 - 3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。
 - 4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisanryo-hc.co.jp/>

成分・分量(膏体100g中)

成分	分量	はたらき
フェルビナク	0.7g	痛みの原因物質(プロスタグランジン)の生成をおさえ、痛みをやわらげます。
アルニカチンキ	1mL (原生薬として0.2g)	はれや炎症をやわらげます。

添加物：ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、D-ソルビトール、グリセリン、ポリソルベート80、ケイ酸アルミン酸Mg、カオリン、酸化チタン、エドト酸Na、pH調節剤、N-メチル-2-ピロリドン、l-メントール

[1枚あたり(10cm×14cm)膏体量10g]

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
- 5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

