

この説明文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、よくお読みください。

第2類医薬品

## 消炎・鎮痛パップ剤

インドメタシン配合

6枚入 14cm×10cm (1枚) 膏体量13g、膏体肌色 (保湿チャック付)

パテックスID

## 特徴

パテックスIDは消炎・鎮痛成分インドメタシンを配合し、スーッとする成分と水分を多く含む基剤により、さわやかな貼り心地が続く微香性の冷感タイプの消炎・鎮痛パップ剤です。

●インドメタシン配合によるすぐれた消炎・鎮痛効果  
インドメタシンの消炎・鎮痛作用により、肩・腰・筋肉の痛みを鎮めます。

●貼りやすさを追求  
フィルムの剥離性にすぐれ、膏体同士が付着しにくく、どの部位にも貼りやすいパップ剤です。  
●爽快な貼り心地  
ペーパメントオイルと水分を多く含む基剤により清涼感と保湿性にすぐれているので、さわやかな貼り心地が続きます。



## 使用上の注意

**×** してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

## 1.次の人は使用しないこと

- (1) 本剤(インドメタシン)によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(以前本剤に配合されているインドメタシンを使用してアレルギー症状を起こしたことがある人が、再び同じお薬を使用すると更に強い症状を起こす可能性がある。)
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。(ぜんそくを起こしたことのある人がインドメタシン等の抗炎症剤を使用するとぜんそく発作を誘発することがある。)
- (3) 15歳未満の小児。

## 2.次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等または化膿している患部。

## 3.2週間以上継続して使用しないこと



## 相談すること

## 1.次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

## 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること

## (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

## その他の注意

本剤をはがす時にはゆつくりはがすこと

(本剤は粘着力が強いのですがはがす時に発赤、かゆみ等を起こすことがある。)

## 効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

## 用法・用量

年 齢	使用方法
15歳以上	1日1~2回患部に貼付する。
15歳未満	使用しないこと。

## &lt;用法・用量に関連する注意&gt;

(1) 用法・用量を厳守すること。(2) 表面のフィルムをはがし使用すること。(3) 本剤は痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用すること。(4) 汗をかいたり、患部がみられている時は、よく拭きとってから使用すること。(5) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。

## 成分・分量

成 分	分 量	はたらき
インドメタシン	350mg	炎症を抑え、痛みをやわらげる

添加物:クロタミトン、N-メチル-2-ヒロリドン、ハッカ油、カルメロースNa、ゼラチン、水酸化Al、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、グリセリン、エト酸Na、チモール、無水ケイ酸、酸化チタン、pH調節剤、黄色5号、その他4成分

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になりたり品質が変わる。)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉め外気にふれないようにすること。
- (5) 本剤の使用期限は袋に記載してあるので、使用期限内に使用すること。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

ニスロパッチ株式会社

埼玉県春日部市南栄町8番地1



登録商標

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電 話 03(5205)8331  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankeyo-hc.co.jp/>