

医薬品を正しく購入するための  
**説明文書**

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	プレコールエース顆粒
2	成分・分量	<p>3包(1包 2.2g)中          葛根湯エキス(乾燥)1140mg、アセトアミノフェン 705mg、          クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、          グアヤコールスルホン酸カリウム 150mg、無水カフェイン 90mg、          リボフラビン(ビタミン B<sub>2</sub>) 7.5mg、アスコルビン酸(ビタミン C) 300mg</p> <p>&lt;成分・分量に関連する注意&gt;          (1)本剤に配合されているリボフラビン(ビタミン B<sub>2</sub>)により、尿が黄色になることがあります。          (2)本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミン C を含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。          ※添加物は外箱、添付文書を参照</p>
3	用法・用量	<p>次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用して下さい。          成人(15歳以上):1包          12歳以上15歳未満:2/3包          12歳未満:服用しないで下さい。</p>
4	効能・効果	<p>かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和</p>
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい。          (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人          (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人          (3)12歳未満の小児</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。          他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。          4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。          5. 服用前後は飲酒しないで下さい。          6. 長期連用しないで下さい。</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい。          (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人          (2)妊婦又は妊娠していると思われる人          (3)高齢者          (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人          (5)次の症状のある人:高熱、排尿困難          (6)次の診断を受けた人:甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</p> <p>【12歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。