

医薬品を正しく購入するための 説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	プレコール持続性鼻炎カプセル LX
2	成分・分量	4カプセル中 ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg、フェニレフリン塩酸塩 10 mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg、ペラドンナ総アルカロイド 0.4mg、 グリチルリチン酸 45mg、無水カフェイン 100mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を、1日2回、(朝・夕)服用して下さい。 成人(15歳以上):2カプセル 7歳以上15歳未満:1カプセル 7歳未満:服用しないで下さい。
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和: 鼻づまり、鼻水、くしゃみ、なみだ目、のどの痛み、頭が重い
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい。</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2) 次の症状のある人: 前立腺肥大による排尿困難</p> <p>(3) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。</p> <p>他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、 乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。</p> <p>4. 長期連用しないで下さい。</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人</p> <p>(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人</p> <p>(3) 授乳中の人</p> <p>(4) 高齢者</p> <p>(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、ふるえ、動悸を 起こしたことがある人</p> <p>(7) 次の症状のある人: 高熱、排尿困難、むくみ</p> <p>(8) 次の診断を受けた人: 緑内障、腎臓病</p> <p>(9) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人 (セレギリン塩酸塩は、パーキンソン病の治療に用いられる)</p> <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい】</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。