

# 医薬品を正しく購入するための 説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	プレコール持続性カプセル
2	成分・分量	4 カプセル中 イソプロピルアンチピリン(ピリン系) 300mg、アセトアミノフェン 450mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 12mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、カンゾウエキス末 118mg (原生薬として 983mg) 無水カフェイン 75mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日2回、朝・夕食後なるべく30分以内に服用して下さい。 成人(15歳以上):2カプセル 15歳未満:服用しないで下さい。
4	効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、鼻水、鼻づまり、せき、たん、悪寒、頭痛、 関節の痛み、筋肉の痛み、くしゃみ)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。</p> <p>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないで下さい。</p> <p>6. 長期連用しないで下さい。</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人:高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人:甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、 胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、 閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。