

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ピロエース W 軟膏
2	成分・分量	100g 中 ピロールニトリン 0.2g(力価)、クロトリマゾール 0.4g、クロタミトン 5g 塗布後ほてり(熱感)を感じるがありますが、短時間のうちに消失します。 ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	1日2~3回、適量を患部に塗布して下さい。
4	効能・効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次の部位には使用しないで下さい。 (1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等 (2)しっしん (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部 次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師の治療を受けている人 (2)乳幼児 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が広範囲の人 (5)患部が化膿している人 (6)「しっしん」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人 (陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、しっしん等他の原因による場合が多い)
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。