

ピンは割れものですので、
お取扱いにご注意下さい。

指定医薬部外品 販売名：
リゲインZ2

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10
製造 田村薬品工業株式会社
販売元 奈良県御所市西寺田50

[1本(50mL)中の成分]ベンフォチアミン(ピオ
タミン:ビタミンB₁誘導体)10mg、ビタミンB₂リ
ン酸エステル 5mg、ビタミンB₆ 10mg、ニコチ
ン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg、カル
ニチン塩化物 100mg、ジクロロ酢酸ジイソプロ

ピルアミン(リパオール)
30mg、L-アルギニン塩
酸塩 30mg、クコシエ
キス 60.7mg (枸杞子
200mgに相当)、ショウ
キョウエキス 48.5mg
(生姜500mgに相当)

添加物: エリス
リトール、アセスル
ファミK、スクラロー
ス、安息香酸Na、DL-
リンゴ酸、クエン酸Na、
クエン酸、カラメル、香料、
グリセリン、プロピレン

グリコール、パニリン、エチルパニリン、ビタミンE、
ミツロウ、アルコール (アルコール0.1ml以下)

つらい疲れに
3.5kcal/1本あたり

リゲインZ2
Regain[®]
STYLE

体を温める作用のある
生姜エキス

+

カルニチン塩化物 配合

50mL



Daiichi-Sankyo

[効能・効果] 肉体疲労・発熱性消耗性
疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・
産前産後などの場合の栄養補給、滋養
強壮、虚弱体質

[用法・用量] 成人(15歳以上)1日1回
1本(50mL)を服用する

用法・用量に関連する注意

用法・用量を守ること(他のビタミン
等を含有する製品を同時に使用する
場合には過剰摂取等に注意すること)

[使用上の注意] **相談すること** 次の
場合は、直ちに服用を中止し、この
製品を持って医師又は薬剤師に相談
すること 1. 服用後、皮ふに発疹、
消化器に胃部不快感、下痢の症状が
あらわれた場合 2. しばらく服用し
ても症状がよくなる場合

[保管及び取扱い上の注意] 1. 直射
日光の当たらない涼しい所に保管す
ること 2. 小児の手の届かない所に
保管すること 3. 生薬エキスを配合し
ていますので、ときに沈殿を生じると
ありますが、効果には変わりあり
ません。よく振って服用して下さい

リゲイン相談ダイヤル 0120-488024



ガラス:瓶
金属:キャップ

ラベル:PET 02⑥登録商標

製造番号

使用期限