

ピンは割れものですので、お取扱いにご注意下さい。

指定医薬部外品 販売名: リゲインZ1

リゲイン相談ダイヤル 0120-488024

1本(50mL)あたり3.5kcal
リゲイン24(販売名リゲイン)比 91%カット

[1本(50mL)中の成分]ベンフォチアミン(ピオタミン):
ビタミンB₁誘導体) 10mg、ビタミンB₂リン酸エステル
5mg、ビタミンB₆ 10mg、ニコチン酸アミド 30mg、
無水カフェイン 50mg、カルチン塩化物 100mg、
ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン(リパオール) 30

mg、L-アルギニン塩酸塩
30mg、ココシエキス 60.7
mg(枸杞子200mgに相
当)、ショウキョウエキス
48.5mg(生姜500mg
に相当) 添加物:エリスリ
トール、
アセシル
ファムK、
スクラ
ロース、
安息香酸Na、DL-リンゴ
酸、クエン酸Na、クエン酸、
カラメル、香料、グリセリン、
プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、ビタミンE、ミツロウ、アルコール (アルコール0.1mL以下)

www.regain.jp



糖類0 [ゼロ]
カロリーオフ

50mL

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10
製造 田村薬品工業株式会社
販売元 奈良県御所市西寺田50

リゲイン®
ZERO

ビタミン・生薬配合

つらい疲れに

Regain

3.5kcal/1本(50mL)

【効能・効果】肉体的疲労・発熱性消耗性疾患・
病中病後・栄養障害・食欲不振・産前産後な
どの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質
【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回1本
(50mL)を服用する 用法・用量に関連す
る注意 用法・用量を守ること(他のビタミン
等を含有する製品を同時に使用する
場合には過剰摂取等に注意すること)

【使用上の注意】**相殺すること**次の場合は、
直ちに服用を中止し、この製品を持って医師
又は薬剤師に相談すること 1.服用後、皮
ふに発疹、消化器に胃部不快感、下痢の
症状があらわれた場合
2.しばらく服用しても症
状がよくなる場合
【保管及び取扱い上の

注意】1.直射日光の当たらない涼しい所に
保管すること 2.小児の手の届かない所に保
管すること 3.生薬エキスを配合しています
ので、ときに沈殿を生じることがありますが、
効果には変わりありません。よく振って服用して下さい



製造国

使用期限

ガラス:瓶
金属:キャップ

ラベル:PET 03 @登録商標