

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃腸薬

第2類医薬品

たべすぎ・のみすぎ・胃のもたれに
タカジアスターゼ® N1 配合

三共胃腸薬錠

《三共胃腸薬錠》は、次のような働きを持った薬剤です。

- 消化酵素の働きで、食物の消化を助け、胃腸の負担を軽くします。
- 制酸剤の配合により、過剰の胃酸を中和して、すみやかに胸やけなどの過酸症状を改善し、胃壁を保護します。
- スッキリした味と香りをもつ健胃和漢薬(生薬)の作用により、消化液の分泌を促して、食欲を増し、胃腸の機能をたかめます。
- 胃の痛みをしずめる働きがあります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないで下さい

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6) 次の症状のある人
排尿困難
(7) 次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

■ 効能・効果

- 食べ過ぎ、飲み過ぎ、もたれ、胸つかえ、食欲不振(食欲減退)
- 消化不良、消化促進、胃弱、胃部・腹部膨満感
- 胸やけ、胃酸過多、胃痛、胃重、胃部不快感、げっぷ(おくび)
- はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐

■ 用法・用量

年齢	1回服用量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回 食後に服用して下さい
11歳以上15歳未満	2錠	
11歳未満	服用しないで下さい	

<用法・用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■ 成分

《三共胃腸薬錠》は、淡灰かっ色～淡かっ色の錠剤で、特異な香りと味があり、9錠中、次の成分を含有しています。

成分	含量 (9錠中)	作用
タカジアスターゼN1	150 mg	広いpH域で働く消化酵素で、消化を助け、栄養の吸収をよくする
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	(乾燥物として) 900 mg	持続的な制酸作用を有する また胃粘膜の炎症面を保護する働きもある
炭酸水素ナトリウム	675 mg	速効的な制酸作用を有し、胸やけ、げっぷ(おくび)などの過酸症状を改善する
沈降炭酸カルシウム	450 mg	
ロートエキス	30 mg	胃液の分泌を抑制し、胃痛をしずめる
オウバク末	201 mg	味や香りによって味覚を刺激し、胃液や消化液の分泌を促し、消化を助ける
ケイヒ末	223.5 mg	
ウイキョウ末	60 mg	
チョウジ末	30 mg	
ショウキョウ末	73.5 mg	
l-メントール	6 mg	
カンゾウ末	354 mg	胃腸の過度の緊張をおさえて、胃壁を保護する

添加物：サンショウ、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、バレイショデンプン

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります。)

4. 開封後はなるべく早くご使用下さい(本剤は湿気を吸いやすい。)
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電 話 03 (6667) 3232

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

Y04®登録商標

特納用