

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃もたれ・胃の痛み・飲みすぎに効く
セトラキサート塩酸塩配合

第2類医薬品
胃腸薬

新センロック[®]散剤 Senlock[®]

新センロック散剤の特徴

- 胃粘膜の血流を改善して、荒れた粘膜を修復するセトラキサート塩酸塩を配合しています。
- 胃の痛みやけいれんをおさえるロートエキスを配合しています。
- 爽やかなメントール味で、口に含むと早く溶ける散剤です。
- アルミニウム及びナトリウムを含んだ制酸剤は配合されていません。
- 携帯に便利なスティック包装で、外出先でも気軽に服用できます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
フェニルケトン尿症の人
(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有するため)
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人
排尿困難
(6) 次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎等)、血栓症を起こすおそれのある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、胃・腹部膨満感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
□のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃もたれ、胃の痛み、飲みすぎ、胃部不快感、胃部膨満感、胃重、胸つかえ、胸やけ、げっぷ、はきけ(むかつき、嘔気、二日酔・悪酔のむかつき)、嘔吐、胃酸過多



胃もたれ



胃の痛み



飲みすぎ



胸やけ

用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回 食間又は就寝前に服用して下さい。
15歳未満	服用しないで下さい。	

(食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです)



朝食の2~3時間後に



昼食の2~3時間後に



夕食の2~3時間後
又はおやすみ前に

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守して下さい。

成分・分量

本剤は、3包(1包1.2g)中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
セトラキサート塩酸塩	600mg	胃粘膜の血流を改善し、荒れた胃粘膜を修復します。
ロートエキス3倍散 (ロートエキスとして30mg)	90mg	胃の痛みやけいれんをしずめ、胃液の分泌もおさえます。
沈降炭酸カルシウム	1200mg	胃痛や胸やけの原因のひとつとなる
水酸化マグネシウム	300mg	出過ぎた胃酸を中和します。

添加物：バレイショデンブ、アスパルテム(L-フェニルアラニン化合物)、エリスリトール、トウモロコシデンブ、ヒドロキシプロピルセルロース、L-メントール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

A9®登録商標



Daiichi-Sankyo

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10