

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新センロック散剤
2	成分・分量	3包(1包 1.2g)中 セトラキサート塩酸塩 600mg、ロートエキス 3倍散 90mg (ロートエキスとして 30mg)、 沈降炭酸カルシウム 1200mg、水酸化マグネシウム 300mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日3回、食間又は就寝前に服用して下さい。 成人(15歳以上):1包 15歳未満:服用しないで下さい。 (食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです)
4	効能・効果	胃もたれ、胃の痛み、飲みすぎ、胃部不快感、胃部膨満感、胃重、胸つかえ、胸やけ、 げっぷ、はきけ(むかつき、嘔気、二日酔・悪酔のむかつき)、嘔吐、胃酸過多
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないで下さい。 フェニルケトン尿症の人 (本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有するため) 本剤を服用している間は、次の医薬品も服用しないで下さい。 胃腸鎮痛鎮痙薬 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。 (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります) <p>次に該当する人はお申し出下さい。</p> <ol style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人 妊婦又は妊娠していると思われる人 高齢者 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 次の症状のある人 排尿困難 次の診断を受けた人 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害、 血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎等)、 血栓症をおこすおそれのある人 <p><その他の注意> 母乳が出にくくなることがあります。</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。