

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビタミンEC主薬製剤

第3類医薬品

天然型ビタミンE  
ビタミンC・B2配合

# ビトンハイ® ECB2

末梢血行障害の肩こり・冷え  
しみ、そばかすに

## ビトンハイECB2の特徴

体内での効果がすぐれている天然型ビタミンEに、ビタミンC、持続型のビタミンB2酪酸エステルを配合した製剤です。ビタミンEは血行をよくするビタミンとしてよく知られており、また過酸化脂質の産生を防ぐ上で大切なビタミンです。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振


- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
便秘、下痢
- 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## ■ 効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和  
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和  
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防  
歯ぐきからの出血、鼻出血

[ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい]

- 次の場合のビタミンECの補給  
病中病後の体力低下時、老年期、肉体疲労時



肩・首すじのこり 日焼け・かぶれによる色素沈着 手足のしびれ・冷え

## ■ 用法・用量

次の量を服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	1～3回
11歳以上15歳未満	2/3包	なお、1日2回の場合は朝夕、 3回の場合は朝昼晩に服用 して下さい。
7歳以上11歳未満	1/2包	
7歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## ■ 成分・分量

本剤は、芳香があり、酸味とわずかに甘味のある黄色の顆粒剤です。3包（1包2g）中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量
酢酸 <i>d</i> - $\alpha$ -トコフェロール（天然型ビタミンE）	300mg
アスコルビン酸（ビタミンC）	1000mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB <sub>2</sub> 酪酸エステル）	12mg

添加物：トウモロコシデンプン、セルロース、白糖、乳糖、ポリソルベート80、ヒドロキシプロピルセルロース、香料

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1)本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。
- (2)本剤に配合されているビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

## ■ 作用

### ●効果のすぐれた成分が配合されています

天然型ビタミンE（酢酸*d*- $\alpha$ -トコフェロール）は数多くのビタミンE同族体のうち、体内での効果がすぐれています。ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステルは、従来のビタミンB<sub>2</sub>にくらべ、体内での持続性にすぐれており、また血中の脂質代謝にも関与しています。

### ●過酸化脂質の増加を防ぐビタミンEが末梢血行障害を緩和します

脂肪が変質した過酸化脂質は血管などに悪影響を及ぼしますが、過酸化脂質の増加を防ぐはたらきのある天然型ビタミンEは、末梢血行障害による手足のしびれや冷えを緩和します。またビタミンC・ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステルがその作用をたかめます。

### ●血管壁を丈夫にします

血管壁を丈夫にする作用があり、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。

### ●日焼けやシミなど色素の沈着を緩和します

ビタミンCは日焼けやシミなど色素の沈着を緩和する作用があります。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電 話 0120-337-336  
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

09®登録商標



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10