

缓解花粉等引发的鼻塞流涕和打喷嚏等症状

日本制造

# エーザールカット<sup>®</sup>EX<sub>c</sub> <季节性アレルギー専用>

AG Allercut<sup>®</sup>EX<sub>c</sub> <专治季节性过敏症>

加入了丙酸倍氯米松（类固醇）的滴鼻剂

指定第二类非处方药



## 功能主治

缓解花粉等季节性过敏症引发的下述症状：鼻塞流涕（鼻涕过多）、打喷嚏

## 用法用量 / 使用方法

年齢	1次使用量	1日使用次数
成人（18岁以上）	在左右鼻腔内各喷1次	通常可使用2次（早・晚）
未滿18岁	请勿使用。	


1日最多可以使用4次（喷8次），请保证3小时以上的使用间隔。

- 症状有所缓解后，请减少使用次数。如症状再次出现恶化，可以增加使用次数。
- 1年内请不要累计使用本品3个月以上。

<使用注意>

- (1) 本品加入了丙酸倍氯米松（类固醇），过量使用或错误的用法很有可能会导致出现副作用，请严格遵守使用方法。
- (2) 请不要将本品用于鼻腔以外的部位。
- (3) 使用时如嘴里感觉有味道，请漱口。

- ① 鼻腔内化脓时，请勿使用。
- ② 使用前请先将鼻涕擤干净。（擤鼻涕时请不要用太大力气）
- ③ 摘掉蓝色瓶盖，如图拿起容器。  
(首次使用时，请先空按喷雾器数次，直至有药液喷出)
- ④ 将喷嘴前端轻轻伸入鼻腔，喷射一次药液。  
然后，请用相同的动作在另一侧鼻腔中喷药液。
- ⑤ 使用后，请用干净的纸巾等擦拭喷嘴，并盖好瓶盖。



## 成分、分量（每100g）

成分	份量	作用
丙酸倍氯米松	0.1g	對於鼻黏膜發揮作用，抑制鼻塞、流鼻水等症狀。

添加剂：聚羧乙烯、L-精氨酸、乙醇、张度剂、苯扎氯铵、乙二胺四乙酸二钠、薄荷油、薄荷醇、聚山梨醇酯80、pH调节剂

<成分与含量的注意事项>

本品含有酒精成分，可能会造成伤口刺痛。

## 使用注意事项

### 禁忌事项

(不遵守禁忌事项, 可能会使症状加剧或引发副作用)

1. 下列患者请勿使用本品。

(1) 被诊断患有下述疾病的患者

全身性真菌感染、结核性疾病、高血压、糖尿病、反复性鼻出血、哮喘、青光眼、感染性疾病

(2) 鼻腔化脓(毛孔感染引发了脓液积聚并出现肿痛)的患者

(3) 曾因使用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的患者

(4) 未满 18 岁的人群

(5) 正在孕期或备孕中的患者

(6) 过去 1 年内曾累计使用类固醇类滴鼻剂 3 个月以上的患者

2. 1 年以内, 请不要累计使用本品和其他类固醇类滴鼻剂 3 个月以上。

(如需累计使用 3 个月以上时, 有可能患有其他疾病, 请咨询耳鼻喉专科医生)

3. 用完本品后, 请不要使用其他类固醇类滴鼻剂。但是, 如医生开出此类药品, 请遵医嘱进行用药。

### 需遵医嘱的情况

1. 下列患者在使用前, 请前往咨询医生、药剂师或授权药房。

(1) 正在接受医生治疗的患者

(2) 正在接受脱敏疗法和过敏治疗的患者

(3) 头部、额头和脸颊等部位有痛感, 且流出黄色或绿色鼻涕的患者(感染性鼻窦炎)

(4) 正在哺乳期的患者

(5) 曾出现药物过敏等过敏反应的患者

(6) 无法确定症状的诱因是否来自季节性过敏症的患者

(7) 高龄患者

(8) 患有肥厚性鼻炎\*1 或鼻痔(鼻息肉)\*2 的患者

\*1: 鼻腔附近有胀痛感, 有少量粘液或黄色、绿色的鼻涕流出

\*2: 鼻塞、鼻音重、鼻腔深处有异物感

(9) 正在接受长期或大范围全身性类固醇疗法的患者