

エーヅ-アレルギーカット[®]EX_c <季節性アレルギー専用>

AG Allercut[®]EX_c <季節性抗過敏専用>

含有丙酸倍氯米松（類固醇）的點鼻藥



指定第 2 類醫藥品

效能與效果

舒緩花粉等季節性過敏所引起的以下症狀：鼻塞、流鼻水（鼻水過多）、打噴嚏

用法與用量／使用方法

年齡	1 次用量	1 天使用次數
成人（18 歲以上）	兩邊鼻腔內各噴灑 1 次	通常可使用 2 次（早・晚）
未滿 18 歲	請勿使用。	


1 日最多可使用 4 次（噴霧 8 次），但請保持 3 小時以上的間隔。

- 症狀有所改善時，請減少使用次數。當症狀再次惡化時，可增加使用次數。
- 1 年內累計使用期間，請勿使用超過 3 個月以上。

<使用方法相關注意事項>

- (1) 本劑含有丙酸倍氯米松（類固醇），若使用過量或以錯誤的方法使用可能會引起副作用，請嚴格遵守使用方法。
- (2) 僅可用於點鼻。
- (3) 使用時若感覺到異味，請進行漱口。

- ① 鼻腔內化膿時，請勿使用。
- ② 使用前請先小心地擤鼻涕。（請勿過度用力擤鼻涕）
- ③ 打開藍色瓶蓋，如圖所示的方式握持容器。
（第一次使用時，需先空按數次，直到藥液開始噴出）
- ④ 將噴嘴前端輕輕伸入鼻腔內，噴灑 1 次藥液。另一邊的鼻腔也請重覆同樣的操作。
- ⑤ 使用後，請以面紙等將噴嘴擦拭乾淨，然後蓋上瓶蓋。



成分與份量（每 100g）

成分	份量	作用
丙酸倍氯米松	0.1g	對於鼻黏膜發揮作用，抑制鼻塞、流鼻水等症狀。

添加物：聚羧乙烯、L-精胺酸、乙醇、等滲調節劑、苯紫氯銨、乙二胺四乙基二鈉、薄荷油、薄荷醇、吐溫 80、pH 調整劑

<成分與份量相關注意事項>

本劑含有酒精，可能會產生刺痛。

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用。)

1. 以下情形者請勿使用。
 - (1) 被診斷出有以下疾病的人
全身性的真菌症、結核性疾病、高血壓、糖尿病、反復性鼻出血、氣喘、青光眼、感染症
 - (2) 鼻腔化膿（由於毛根感染而蓄膿，同時出現疼痛或腫脹）的人
 - (3) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀的人
 - (4) 未滿 18 歲的人
 - (5) 孕婦或有可能懷孕的人
 - (6) 過去 1 年之內，曾累計使用類固醇點鼻藥超過 3 個月期間的人。
2. 本劑與其他類固醇點鼻藥的累計使用期間，在 1 年內請勿超過 3 個月以上。
(如需累計使用 3 個月以上時，有可能患有其他疾病，請諮詢耳鼻喉專科醫師)
3. 使用本劑後，請勿再使用類固醇點鼻藥。但醫師有開立處方時，請依其指示。

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師或登記合格的銷售商諮詢。
 - (1) 正在接受醫師治療者
 - (2) 正在進行脫敏療法或過敏治療者
 - (3) 頭部、額頭或臉頰等處有疼痛感、出現黃色或綠色等鼻涕的人（感染性副鼻腔炎）
 - (4) 哺乳中的人
 - (5) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (6) 不確定過敏症狀是否起因於季節性過敏的人
 - (7) 高齡者
 - (8) 患有肥厚性鼻炎 *1 或鼻息肉（鼻 Polyps）*2 的人
*1：鼻子周圍有沉重感，出現少量黏液性或黃綠色的鼻涕
*2：鼻塞、鼻音重、鼻腔內有異物感
 - (9) 接受長期或大量的全身性類固醇療法者