

缓解花粉、屋尘等造成的眼部过敏症状

日本制造

エージアイズ® **アレルギーカット[®]C**

AG Eyes Allercut C 抗过敏眼药水

加入了色甘酸钠(Sodium cromoglicate)的眼药水

第2類医薬品



功能主治

缓解花粉、屋尘（室内灰尘）等造成的下列眼部过敏症状：眼睛痒痛、眼睛充血、眼睛模糊（眼垢过多等）、流眼泪、有异物感（眼中有东西在滚动）


用法用量 / 使用方法

每次1～2滴，每日使用4～6次即可。

〈使用注意〉

- (1) 请严格遵守使用方法。
- (2) 儿童使用时，需在家长的监督指导下使用。
- (3) 请不要让容器前端接触到眼睑与睫毛。请勿使用已经浑浊的眼药水。
- (4) 使用前，请先摘下隐形眼镜。
- (5) 请不要将本品用于眼睛以外的部位。

1. 使用前请先将手洗净。
2. 轻轻向下按压下眼睑，在眼球正上方滴1～2滴。
请注意，不要让容器前端接触到眼睑与睫毛。
3. 滴完后，请闭上眼睛，让眼药水彻底滋润双眼。
4. 使用后，请盖紧瓶盖，以保证容器前端与瓶盖的干净卫生。



成分、分量

本品为无色～淡黄色的透明眼药水，每100mL本品含有以下药效成分。

成分	分量
Sodium cromoglicate	1 g
Chlorpheniramine maleate	0.015 g
Dipotassium glycyrrhizinate	0.125 g
Sodium chondroitin sulfate	0.2 g

添加剂：Sodium edetate, boric acid, borax, benzalkonium chloride, propylene glycol, polysorbate 80, dl-camphor, d-borneol, pH adjuster, sodium hyaluronate

禁忌事项

(违反禁忌事项, 可能会使症状恶化或容易引发副作用及意外事故)

1. 下列人群请勿使用本品。
曾因为使用本品或本品成分出现过敏反应的人群
2. 如合并使用滴鼻剂, 使用后请不要驾驶车辆或操作机械类。
(有时会出现困意等)

需咨询

1. 下列人群在服用前, 请事先咨询医生或药剂师。
 - (1) 正在接受医生治疗的人群
 - (2) 正在接受脱敏疗法和过敏治疗的人群
 - (3) 孕妇或可能怀孕中的人群
 - (4) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
 - (5) 有下述症状的人群: 眼部剧烈疼痛
 - (6) 被诊断有下述疾病的人群: 青光眼
 - (7) 无法确定症状的诱因是否来自过敏反应的人群
特别是下列症状无法判断究竟是否是由过敏反应引发的, 使用前请前往咨询医生。
 - 只有一只眼睛出现问题的时候
 - 只有眼部出现问题, 鼻子没有出现相应症状的时候
 - 对视力也产生了影响的时候