

舒緩花粉、室內灰塵等所引起的眼睛過敏症狀

日本製

エージアイズ® **アレルギーカットM**

AG Eyes Allercut M 抗過敏眼藥水

含有色甘酸鈉(Sodium cromoglicate)的點眼藥

第2類医薬品



效能與效果

用於舒緩花粉、室內灰塵等所引起的下列眼睛過敏症狀：眼睛癢、眼睛充血、眼睛模糊（眼屎過多時等）、淚眼、異物感（感到有異物在眼內移動）

用法與用量／使用方法

1 次點眼 1 ~ 2 滴、1 天點 4 ~ 6 次。

< 使用方法相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守使用方法。
- (2) 讓兒童使用時，須有家長在旁指導監督。
- (3) 容器尖端請勿接觸到眼皮、眼睫毛。
此外點眼藥變混濁時，請勿使用。
- (4) 請勿在佩戴隱形眼鏡的情況下使用。
- (5) 僅可用於點眼。
- (6) 本藥劑為具有濃稠度的藥液，點眼後，可能會使視線暫時模糊，敬請特別注意。

1. 使用前請將手洗淨。
2. 將下眼皮輕輕往下拉，由正上方滴入眼睛 1 ~ 2 滴。
此時請注意避免讓容器尖端接觸到眼皮、眼睫毛。
3. 點眼之後，請閉上眼睛，讓眼藥水均勻擴散至眼睛四周。
4. 使用後請保持容器尖端與蓋子的清潔，並確實蓋緊蓋子。



成分與份量

本劑為無色~微黃色清澄的點眼劑，每 100mL 中含有以下成分：

成分	份量
Sodium cromoglicate	1 g
Chlorpheniramine maleate	0.015 g
Dipotassium glycyrrhizinate	0.125 g
Sodium chondroitin sulfate	0.2 g

添加物：Sodium edetate, boric acid, borax, benzalkonium chloride, propylene glycol, polysorbate 80, dl-camphor, dl-borneol, pH adjuster, hypromellose, sodium hyaluronate

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用與事故)

1. 以下情形者請勿使用。
 - 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者。
2. 與點鼻藥同時使用時，請勿在使用後駕駛交通工具或操作機械類裝置。
 - (可能會出現嗜睡等症狀)

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，使用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
 - (1) 正在接受醫師治療者
 - (2) 正在進行脫敏療法或過敏治療者
 - (3) 孕婦或有可能懷孕的人
 - (4) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (5) 有以下症狀的人：眼睛嚴重疼痛
 - (6) 被診斷患有以下疾病者：青光眼
 - (7) 不清楚是否因過敏或其他原因所引起的症狀者特別是以下情形無法斷定為過敏所致，使用前請先向醫師諮詢。
 - 只有一邊的眼睛出現症狀時。
 - 只有眼睛出現症狀，鼻子並未出現症狀。
 - 連視力也受到影響時。