使用前请务必阅读本说明书。 同时应对此说明书进行妥善保管,以便在必要时取阅。

胃肠药

第2类医药品 针对胃胀、反胃、胃部不适 迅速溶解有效舒缓

-三共胃肠药细粒 s

第一三共胃肠药细粒 s 的特点

- 本药剂拥有以下作用,可用于舒缓胃胀、反胃、胃部不适等症状。
- ●脂肪酶"Lipase AP12"与消化酶"Taka-Diastase N1"有助消化。
- ●6 种健胃成分作用于虚弱的胃部,有效针对胃部不适、食欲不振等症状。
- ●生药野梧桐、甘草末修复胃粘膜不适、糜烂,3种制酸剂中和胃酸,抑 制胃痛原因。
- ●不含钠成分,介意摄取盐分的人群亦可服用。

使用注意事项

※ 禁止事項

(若不遵守可能会导致目前的症状恶化或容易产生副作用)

- 1. 以下人群请勿服用。 正在接受透析疗法者
- 2. 请勿长期连续服用。



咨询事项

- 1. 以下人群请在服用前咨询医师、药剂师或登录销售者。
 - (1)正在接受医师治疗者
 - (2)曾对药物等产生过敏症状者
 - (3)被诊断出患有以下疾病者 肾脏病
- 2. 服用后若出现以下症状时,有可能为不良反应,请立即停止服用本剂,并 携带本说明书。咨询医师、药剂师或登录销售者。

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、发痒

- 3. 服用后,可能会出现下列症状,此症状持续或变严重时请停止服用本剂, 并携带此说明书。询咨医师、药剂师或登录销售者。 便秘、腹泻
- 4. 服用2周左右后症状无改善时,请停止服用本剂,并携带本说明书,咨询 **医师、药剂师或登录销售者。**

功能主治

- ■胃胀、饮食过多、饮酒过量、胸闷、食欲不振
- ●烧心、胃痛、胃酸过多、胃重、胃部不适、打嗝
- ●消化不良、促进消化、胃弱、胃部及腹部有膨胀感
- ●恶心(反胃、宿醉·酩酊大醉导致的呕吐感、恶心)、呕吐









冒部不话

用法・用量

请依照下述用量,用冷水或温水送服。

年龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁 或 以 上	1 包	
11 岁或以上未满 15 岁	2/3 包	0.15
8 岁或以上未满 11 岁	1/2 包	3 次 请在餐后服用。
5 岁或以上未满 8 岁	1/3 包	
3 岁或以上未满 5 岁	1/4 包	
未 满 3 岁	请勿服用。	

〈用法及用量的相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法及用量。
- (2) 3 岁或以上幼儿服用时,请在家长或监护人指导监督下服用。

成分・分量

本剂为白色或略微带黄褐色的白色细粒与淡褐色或褐色的细粒混合物,每3包(1包1.3g)中含有以下成分。

成分	分量	作用	
Taka-diastase N1	150mg	pH 值范围较广的消化酶, 帮助消化, 促 进营养吸收。	
Lipase AP12	60mg	脂肪酶,具有消化作用。	
Mallotus bark extract	63mg (按野梧桐计算为 504mg)	抑制肠胃过度紧张,保护胃粘膜,舒缓 胃部炎症。	
Powdered glycyrrhiza	150mg		
Magnesium aluminosilicate	1200mg	持续保持制酸作用及保护胃粘膜炎症	
Synthetic hydrotalcite	450mg	部分。且合成水滑石(Synthetic hydrotalcite)还具有速效性。	
Magnesium hydroxide	600mg	拥有速效制酸作用,舒缓烧心、打嗝等 胃酸过多导致的症状。	
Powdered phellodendron bark	105mg		
Powdered cinnamon bark	225mg		
Powdered fennel	60mg	以味道和气味刺激味觉, 调整胃液与消化液分泌, 促进消化。	
Powdered clove	30mg	化权力必,促进用化。	
Powdered ginger	75mg		
I-menthol	9mg		

添加剂: cellulose, lactose, polysorbate 80, hydroxypropyl cellulose. zanthoxylum fruit

保管及使用注意事项

- (1) 请避免阳光直射,保管在潮气小的阴凉处。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中(会导致误用或变质)。
- (4) 若将 1 包分成数次服用时,请将袋口折迭封好保管,并在 2 天内服用。
- (5) 请勿使用超过标注使用期限的产品。

有关本品信息,请向所购买的店铺或以下窗口咨询。

第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室

邮编 103-8234 东京都中央区日本桥 3-14-10 电话号码 0120-337-336

工作时间 9:00~17:00(周六、周日及节假日除外)

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/



销售商

一三共医药保健株式会社

东京都中央区日本桥 3-14-10

生产销售商

田村药品工业株式会社

奈良县御所市西寺田 50