

使用前请务必阅读本说明书。
同时应对此说明书进行妥善保管，以便在必要时取阅。

胃肠药

第2类医药品 针对胃胀、反胃、胃部不适 迅速舒缓

第一三共胃腸薬錠剂s

第一三共胃肠药片剂 s

第一三共胃肠药片剂 s 的特点

本药剂拥有以下作用，可用于舒缓胃胀、反胃、胃部不适等症状。

- 脂肪酶“Lipase AP12”与消化酶“Taka-Diastase N1”有助消化。
- 6种健胃成分作用于虚弱的胃部，有效针对胃部不适、食欲不振等症状。
- 生药野梧桐、甘草末修复胃粘膜不适、糜烂，3种制酸剂中和胃酸，抑制胃痛原因。
- 不含钠成分，介意摄取盐分的人群亦可服用。

! 使用注意事项

⊗ 禁止事项

(若不遵守可能会导致目前的症状恶化或容易产生副作用)

1. 以下人群请勿服用。
正在接受透析疗法者
2. 请勿长期连续服用。



咨询事项

1. 以下人群请在服用前咨询医师、药剂师或登录销售者。
 - (1) 正在接受医师治疗者
 - (2) 曾对药物等产生过敏症状者
 - (3) 被诊断出患有以下疾病者
肾脏病
2. 服用后若出现以下症状时，有可能为不良反应，请立即停止服用本剂，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒

3. 服用后，可能会出现下列症状，此症状持续或加重时请停止服用本剂，并携带此说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。
便秘、腹泻
4. 服用2周左右后症状无改善时，请停止服用本剂，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。

功效

- 胃胀、饮食过多、饮酒过量、胸闷、食欲不振
- 烧心、胃痛、胃酸过多、胃重、胃部不适、打嗝
- 消化不良、促进消化、胃弱、胃部及腹部有膨胀感
- 恶心（反胃、宿醉·酩酊大醉导致的呕吐感、恶心）、呕吐



胃胀



反胃



胃部不适



胃痛

用法·用量

请依照下述用量，用冷水或温水送服。

年龄	1次用量	1天服用次数
15岁或以上	3片	3次 请在餐后服用。
11岁或以上未满15岁	2片	
未满11岁	请勿服用。	

〈用法及用量的相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法及用量。
- (2) 11岁或以上儿童服用时，请在家长或监护人指导监督下服用。

成分·分量

本剂为淡灰褐色或淡褐色裸药片，每9片中含有以下成分。

成分	分量	作用
Taka-diastase N1	150mg	pH 值范围较广的消化酶，帮助消化，促进营养吸收。
Lipase AP12	60mg	脂肪酶，具有消化作用。
Mallotus bark extract	63mg (按野梧桐计算为504mg)	抑制肠胃过度紧张，保护胃粘膜，舒缓胃部炎症。
Powdered glycyrrhiza	150mg	
Magnesium aluminosilicate	720mg	持续保持制酸作用及保护胃粘膜炎症部分。且合成水滑石（Synthetic hydrotalcite）还具有速效性。
Synthetic hydrotalcite	300mg	
Magnesium hydroxide	600mg	拥有速效制酸作用，舒缓烧心、打嗝等胃酸过多导致的症状。
Powdered phellodendron bark	105mg	以味道和气味刺激味觉，调整胃液与消化液分泌，促进消化。
Powdered cinnamon bark	225mg	
Powdered fennel	60mg	
Powdered clove	30mg	
Powdered ginger	75mg	
l-menthol	9mg	

添加剂： zanthoxylum fruit, potato starch, carmellose, magnesium stearate

保管及使用注意事项

- (1) 请避免阳光直射，密封保管在潮气小的阴凉处。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。
- (4) 请勿用湿漉的手拿取药剂。水分可能导致药片表面部分融化、变色或颜色不均。若将附有水分的药片放回药瓶中，将影响其他片剂质量，因此请不要将湿漉的片剂放回药瓶。
- (5) 药瓶内填充物是为防止运输过程中片剂破损，请在开封后将其丢弃。
- (6) 请勿使用超过标注使用期限的产品。请在打开药瓶后12个月以内使用。
- (7) 请在包装盒的“开封年月日”记录栏中，填写打开药瓶的日期。

有关本品信息，请向所购买的店铺或以下窗口咨询。

第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室

邮编 103-8234 东京都中央区日本桥 3-14-10

电话号码 0120-337-336

工作时间 9:00~17:00（周六、周日及节假日除外）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



生产销售商

第一三共医药保健株式会社

东京都中央区日本桥 3-14-10