

修复虚弱的胃部,让肠道状态恢复正常

日本制造

第一三共胃腸薬プラス 細粒

第一三共胃腸药 Plus 颗粒

胃肠药

第2類医薬品



功能主治

- 胃胀、暴饮暴食、胸闷、食欲不振
- 胃灼热、胃痛、胃酸过多、胃部沉重、胃部不适、打嗝
- 消化不良、促进消化、胃虚、胃部/腹部肿胀
- 恶心(反胃、宿醉及醉酒引发的反胃、恶心)、呕吐
- 整肠(通便)、大便稀溏、便秘



胃胀



整肠

用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年龄	1次服用量	1天服用次数
15岁以上	1包	3次 请在餐后服用。
11岁以上、未满15岁	2/3包	
8岁以上、未满11岁	1/2包	
5岁以上、未满8岁	1/3包	
3岁以上、未满5岁	1/4包	
未满3岁	请勿服用。	

〈使用注意〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 让3岁以上的儿童服用时,需在家长的监督指导下服用。

成分、分量

本品是略带淡黄褐色的白色颗粒和淡褐色~褐色颗粒的小包装药品,具有特殊气味。每3包(1包1.3g)中含有以下药效成分。

成分	分量
Taka-diastase N1	150 mg
Lipase API2	60 mg
Lactobacillus sporegene (bulk powder of Lacbon)	60 mg
Magnesium aluminosilicate	900 mg
Synthetic hydrotalcite	600 mg
Precipitated calcium carbonate	600 mg
Powdered phellodendron bark	105 mg
Powdered cinnamon bark	225 mg
Powdered ginger	75 mg
Powdered clove	30 mg
Powdered fennel	60 mg
<i>l</i> -menthol	9 mg
Aldioxa	60 mg
Powdered glycyrrhiza	150 mg

添加剂: Cellulose, lactose, polysorbate 80, hydroxypropyl cellulose, Japanese pepper

使用注意事项

禁忌事项

(违反禁忌事项,可能会使症状恶化或容易引发副作用)

1. 下列人群请勿服用本品。
正在接受透析治疗的人群
2. 请勿长期服用本品。

需咨询

1. 下列人群在服用前,请事先咨询医生或药剂师。
 - (1) 正在接受医生治疗的人群
 - (2) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
 - (3) 被诊断有下述疾病的人群
肾脏疾病、甲状腺功能紊乱