

針對虛弱的胃部發揮效用、協助腸道回復到接近正常的狀態

日本製

第一三共胃腸藥プラス 細粒

第一三共胃腸藥 Plus 細粒

胃腸藥

第2類医薬品



效能與效果

- 胃脹、暴飲暴食、胸口堵塞感、食慾不振
- 胸口灼熱、胃痛、胃酸過多、胃部沉重感、胃部不適、打嗝
- 消化不良、促進消化、胃弱、胃部 / 腹部膨脹感
- 想吐（反胃、宿醉 / 酒醉反胃、噁心）、嘔吐
- 整腸（調整通便）、軟便、便秘



舒緩胃脹



調理腸道

用法與用量 / 使用方法

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

| 年齡 | 1 次用量 | 1 天服用次數 |
|---------------|-------|----------------|
| 15 歲以上 | 1 包 | 3 次 請於飯後服用。 |
| 11 歲以上未滿 15 歲 | 2/3 包 | |
| 8 歲以上未滿 11 歲 | 1/2 包 | |
| 5 歲以上未滿 8 歲 | 1/3 包 | |
| 3 歲以上未滿 5 歲 | 1/4 包 | |
| 未滿 3 歲 | 請勿服用。 | |

< 用法與用量相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 讓 3 歲以上的兒童使用時，須有家長在旁指導監督。

成分與份量

本劑為白色～微黃褐色的細粒、及淡褐褐色～褐色的細粉個別包裝品，具有特殊的氣味。每3包（1包1.3g）中含有以下成分：

| 成分 | 份量 |
|---|--------|
| Taka-diastase N1 | 150 mg |
| Lipase AP12 | 60 mg |
| Lactobacillus sporegene (bulk powder of Lacbon) | 60 mg |
| Magnesium aluminosilicate | 900 mg |
| Synthetic hydrotalcite | 600 mg |
| Precipitated calcium carbonate | 600 mg |
| Powdered phellodendron bark | 105 mg |
| Powdered cinnamon bark | 225 mg |
| Powdered ginger | 75 mg |
| Powdered clove | 30 mg |
| Powdered fennel | 60 mg |
| <i>l</i> -menthol | 9 mg |
| Aldioxa | 60 mg |
| Powdered glycyrrhiza | 150 mg |

添加物：Cellulose, lactose, polysorbate 80, hydroxypropyl cellulose, Japanese pepper

使用注意事項

禁止事項

（若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用）

1. 以下情形者請勿服用。
正在接受透析治療的人
2. 請勿長期連續服用。

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
 - (1) 正在接受醫師治療者
 - (2) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (3) 被診斷出患有以下疾病的人
腎臟病、甲狀腺功能紊亂