

缓解胃部肿胀不适

日本制造

第一三共胃腸薬〔錠剤〕

第一三共胃腸药[片剂]

胃腸药

第2類医薬品



功能主治

- 胃胀、暴饮暴食、胸闷、食欲不振
- 胃灼热、胃痛、胃酸过多、胃部沉重、胃部不适、打嗝
- 消化不良、促进消化、胃虚、胃部 / 腹部肿胀
- 恶心（反胃、宿醉及醉酒引发的反胃、恶心）、呕吐



胃胀



胃部不适



胃痛

用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年齢	1次服用量	1天服用次数
15岁以上	3粒	3次 请在餐后服用。
11岁以上、未满15岁	2粒	
未满11岁	请勿服用。	

〈使用注意〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 让11岁以上的儿童服用时，需在家长的监督指导下服用。

成分与分量

本品是没有特殊气味和味道的淡灰褐色～淡褐色裸片。

每9粒药片含有以下药效成分。

成分	分量
Taka-diastase N1	150 mg
Lipase API2	60 mg
Mallotus japonicus extract	63 mg (相当于Mallotus japonicas 504 mg)
Powdered glycyrrhiza	150 mg
Magnesium aluminosilicate	720 mg
Synthetic hydrotalcite	300 mg
Magnesium hydroxide	600 mg
Scopolia extract	30 mg
Powdered phellodendron bark	105 mg
Powdered cinnamon bark	225 mg
Powdered fennel	60 mg
Powdered clove	30 mg
Powdered ginger	75 mg
l-menthol	9 mg

添加剂：Japanese pepper, potato starch, CMC, magnesium stearate

使用注意事项

禁忌事项

(违反禁忌事项, 可能会使症状恶化或容易引发副作用)

1. 下列人群请勿服用本品。
正在接受透析治疗的人群
2. 在服用本品期间, 请不要使用下述的任何药品。
胃肠解痉止痛药
3. 正在哺乳期的人群请不要服用本品, 如需服用时请避免哺乳。
(可能会随母乳被幼儿吸收, 导致幼儿心跳加快)
4. 请勿长期服用本品。

需咨询

1. 下列人群在服用前, 请事先咨询医生或药剂师。
 - (1) 正在接受医生治疗的人群
 - (2) 孕妇或可能怀孕中的人群
 - (3) 高龄人群
 - (4) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
 - (5) 有下述症状的人群
排尿困难
 - (6) 被诊断有下述疾病的人群
肾脏病、心脏病、青光眼