

舒緩胃食道逆流、不適感 服用後倍感舒適

日本製

第一三共胃腸藥〔錠劑〕

第一三共胃腸藥 [錠劑]

胃腸藥

第2類医薬品



效能與效果

- 胃脹、暴飲暴食、胸口堵塞感、食慾不振
- 胸口灼熱、胃痛、胃酸過多、胃部沉重感、胃部不適、打嗝
- 消化不良、促進消化、胃弱、胃部 / 腹部膨脹感
- 想吐（反胃、宿醉 / 酒醉反胃、噁心）、嘔吐



舒緩胃脹



舒緩胃部不適



舒緩胃痛

用法與用量 / 使用方法

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲以上	3 錠	3 次 請於飯後服用。
11 歲以上未滿 15 歲	2 錠	
未滿 11 歲	請勿服用。	

< 用法與用量相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 讓 11 歲以上的兒童使用時，須有家長在旁指導監督。

成分與份量

本劑為淡灰褐色～淡褐色的裸錠，有特殊氣味。

每9錠含有以下成分：

成 分	份 量
Taka-diastase N1	150 mg
Lipase AP12	60 mg
Mallotus japonicus extract	63 mg (相當於Mallotus japonicus 504 mg)
Powdered glycyrrhiza	150 mg
Magnesium aluminosilicate	720 mg
Synthetic hydrotalcite	300 mg
Magnesium hydroxide	600 mg
Scopolia extract	30 mg
Powdered phellodendron bark	105 mg
Powdered cinnamon bark	225 mg
Powdered fennel	60 mg
Powdered clove	30 mg
Powdered ginger	75 mg
<i>l</i> -menthol	9 mg

添加物：Japanese pepper, potato starch, CMC, magnesium stearate

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用)

1. 以下情形者請勿服用。
正在接受透析治療的人
2. 服用本劑的期間，請勿服用以下醫藥品。
胃腸鎮痛鎮痙藥
3. 哺乳中的人請勿服用本劑，服用本劑時請避免哺乳。
(否則藥效成分可能會進入母乳中，使嬰兒脈搏加速)
4. 請勿長期連續服用。

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
 - (1) 正在接受醫師治療者
 - (2) 孕婦或可能懷孕的人
 - (3) 高齡者
 - (4) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (5) 有以下症狀的人
排尿困難
 - (6) 被診斷出患有以下疾病的人
腎臟病、心臟病、青光眼