

快速缓解疼痛 头痛、痛经

日本制造

ロキソニン[®]S

LOXONIN S

解热镇痛药

第1類医薬品



功能主治

- 缓解头痛、痛经（生理痛）、牙痛、拔牙后疼痛、咽喉痛、腰痛、关节痛、神经痛、肌肉痛、肩膀胀痛、耳朵疼痛、摔伤疼痛、骨折疼痛、扭伤疼痛、外伤疼痛
- 用于恶寒发热时的解热散寒

用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年齢	1次服用量	1天服用次数
成人（15岁以上）	1粒	最多2次。 病症显现时，请尽量不要在空腹时服药。如果服药后再次出现症状，可以进行当天的第3次服药。请保证4小时以上的服药间隔。
未满15岁	请勿服用。	

〈使用注意〉

(1) 请严格遵守用法用量。

成分、分量

本品是淡粉色的裸片。每粒药片含有以下药效成分。

成分	分量
Loxoprofen sodium hydrate	68.1 mg (相当于 anhydrate 60mg)

添加剂: hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, lactose hydrate, iron sesquioxide

〈有关成分、分量的注意事项〉

药片可能会在添加物的作用下出现红色斑点。

使用注意事项

禁忌事项

(如违反禁忌事项, 容易引起症状恶化或引发副作用)

1. 下列人群请勿服用本品。
 - (1) 曾因为服用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群
 - (2) 曾因服用本品或其他解热镇痛药、感冒药出现哮喘症状的人群
 - (3) 未满 15 岁儿童
 - (4) 正在医疗机构治疗下述疾病的人群
胃溃疡、十二指肠溃疡、肝脏病、肾脏病、心脏病
 - (5) 曾被诊断为红血球少(贫血)、血小板少(止血速度慢、易出血)、白血球少等血液异常(血液疾病)的人群
 - (6) 预产期在 12 周以内的孕妇
2. 在服用本品期间, 请不要使用下述的任何药品。
其他解热镇痛药、感冒药、镇静药
3. 服用前后请勿饮酒。
4. 请勿长期服用本品。
(如服用 3 ~ 5 天后仍有疼痛等症状出现, 请立刻停止服用, 并前往咨询医生)

需咨询

1. 下列人群在服用前, 请前往咨询医生、牙科医生或药剂师。
 - (1) 正在接受医生或牙科医生治疗的人群
 - (2) 孕妇或可能怀孕中的人群
 - (3) 正在哺乳期的人群
 - (4) 高龄人群
 - (5) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
 - (6) 被诊断患有下列疾病的人群
支气管哮喘、溃疡性结肠炎、克罗恩氏病、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病
 - (7) 曾患过下列疾病的人群
胃溃疡、十二指肠溃疡、肝脏病、肾脏病、血液疾病