

迅速有效舒緩頭痛、生理痛＋不傷胃的成分

日本製

# ロキソニン®Sプラス

LOXONIN S plus

鎮痛解熱薬

第1類医薬品



## 效能與效果

- 頭痛、月經痛（生理痛）、牙痛、拔牙後的疼痛、咽喉痛、腰痛・關節痛、神經痛、肌肉痛、肩頸酸痛、耳痛、跌撞傷痛、骨折痛、扭傷痛、外傷痛的鎮痛
- 發冷與發熱時的解熱

## 用法與用量／使用方法

年齡	1 次用量	1 日服用次數
成人（15 歲以上）	1 錠	最多 2 次。 出現症狀時，請盡量避免空腹服用。但再次發生症狀時，可以服用第 3 次。服用間隔請保持 4 小時以上。
未滿 15 歲		請勿服用。

< 用法與用量相關注意事項 >

(1) 請嚴格遵守用法與用量。

## 成分與份量

本劑每1錠中含有以下成分：

成分	份量
Loxoprofen sodium hydrate	68.1 mg (相當於 anhydrate 60 mg)
Magnesium oxide	33.3 mg

添加物: lactose, cellulose, hydroxypropyl cellulose, CMC-Na, calcium stearate, hypromellose, titanium oxide, iron sesquioxide, carnauba wax

### 禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用)

1. 以下情形者請勿服用。
  - (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
  - (2) 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥、感冒藥而引起氣喘的人
  - (3) 未滿 15 歲的兒童
  - (4) 曾在醫療機構接受以下治療的人  
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝臟病、腎臟病、心臟病
  - (5) 曾獲醫師告知紅血球數偏少(貧血)、血小板數偏少(容易血流不止、容易流血)、白血球數偏少等血液異常(血液疾病)的人
  - (6) 生產預定日期在 12 週以內的孕婦
2. 服用本劑的期間，請勿服用以下的醫藥品。  
其他鎮痛解熱藥、感冒藥、鎮靜藥
3. 服用前後請勿飲酒。
4. 請勿長期連續服用。  
(服用 3 ~ 5 天後，疼痛等症狀仍反覆出現時，請停止服用，並接受醫師診療。)

### 使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、牙科醫師或藥劑師諮詢。
  - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
  - (2) 孕婦或有可能懷孕的人
  - (3) 哺乳中的人
  - (4) 高齡者
  - (5) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
  - (6) 被診斷出患有以下疾病的人  
支氣管哮喘、潰瘍性結腸炎、克羅恩氏病、係統性紅斑狼瘡、混合型結締組織疾病
  - (7) 曾患有以下疾病的人  
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝臟病、腎臟病、血液疾病