

头痛难忍，速效解决 成分温和，保护您的胃

日本制造

ロキソニン[®]Sプレミアム

LOXONIN S premium

解热镇痛药

第1類医薬品



功能主治

- 缓解头痛、痛经（生理痛）、牙痛、拔牙后疼痛、咽喉痛、腰痛、关节痛、神经痛、肌肉痛、肩膀胀痛、耳朵疼痛、摔伤疼痛、骨折疼痛、扭伤疼痛、外伤疼痛
- 用于恶寒发热时的解热散寒

用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年齢	1次服用量	1天服用次数
成人（15岁以上）	2粒	最多2次。 病症显现时，请尽量选在空腹以外的时候用凉水或温水服药。如果服药后再次出现症状，可以进行当天的第3次服药。请保证4小时以上的服药间隔。
未满15岁		请勿服用。

〈使用注意〉

- (1) 请严格遵守用法用量。

成分、分量

本品为淡粉色的薄膜片剂，每2粒药片中含有以下药效成分。

成分	分量
Loxoprofen sodium hydrate	68.1 mg (相当于 anhydrate 60mg)
allylisopropylacetylurea	60 mg
anhydrous caffeine	50mg
magnesium meta-aluminosilicate	100mg

添加剂: lactose, cellulose, hydroxypropyl cellulose, CMC-Na, magnesium stearate, hypromellose, titanium oxide, talc, iron sesquioxide, carnauba wax

使用注意事项

禁忌事项

(如违反禁忌事项, 容易引起症状恶化或引发副作用)

1. 下列人群请勿服用本品。

- (1) 曾因为服用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群
- (2) 曾因服用本品或其他解热镇痛药、感冒药出现哮喘症状的人群
- (3) 未满 15 岁儿童
- (4) 正在医疗机构治疗下述疾病的人群
胃溃疡、十二指肠溃疡、肝脏病、肾脏病、心脏病
- (5) 曾被诊断为红血球少(贫血)、血小板少(止血速度慢、易出血)、白血球少等血液异常(血液疾病)的人群
- (6) 预产期在 12 周以内的孕妇

2. 在服用本品期间, 请不要使用下述的任何药品。

其他解热镇痛药、感冒药、镇静药、晕车药

3. 服用后, 请不要驾驶车辆或操作机械类。

(有时会出现困意等)

4. 服用前后请勿饮酒。

5. 请勿长期服用本品。

(如服用 3 ~ 5 天后仍有疼痛等症状出现, 请立刻停止服用, 并前往咨询医生)

需咨询

1. 下列人群在服用前, 请前往咨询医生、牙科医生或药剂师。

- (1) 正在接受医生或牙科医生治疗的人群
- (2) 孕妇或可能怀孕中的人群
- (3) 正在哺乳期的人群
- (4) 高龄人群
- (5) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
- (6) 被诊断患有下列疾病的人群
支气管哮喘、溃疡性结肠炎、克罗恩氏病、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病
- (7) 曾患过下列疾病的人群
胃溃疡、十二指肠溃疡、肝脏病、肾脏病、血液疾病