

用於舒緩流鼻水、鼻塞、發燒、喉嚨痛

日本製

# 新ルル<sup>®</sup>Aゴールド<sup>s</sup>

新 Lulu A Gold S 感冒藥

綜合感冒藥

指定第2類医薬品



## 效能與效果

舒緩感冒的各種症狀（流鼻水、鼻塞、發燒、喉嚨疼痛、咳嗽、有痰、打噴嚏、發冷、頭痛、關節痛、肌肉痛）

## 用法與用量／使用方法

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1 次用量	1 天服用次數
成人（15 歲以上）	3 錠	3 次 請儘量在飯後 30 分鐘內服用。
12 歲以上未滿 15 歲	2 錠	
未滿 12 歲		請勿服用。

< 用法與用量相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 12歲以上兒童服用時，須有家長在旁指導監督。

## 成分與份量

本劑為白色的糖衣錠，每 9 錠含有以下成分：

成分	份量
Clemastine fumarate	1.34 mg
Belladonna total alkaloids	0.3 mg
Bromhexine hydrochloride	12 mg
Acetaminophen	900 mg
Dihydrocodeine phosphate	24 mg
Noscapine	48 mg
dl-methylephedrine hydrochloride	60 mg
Anhydrous caffeine	75 mg
Benfotiamine (vitamin B <sub>1</sub> derivative)	24 mg

添加物：Cellulose, magnesium aluminometasilicate, CMC-Ca, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, gum arabic, titanium oxide, stearic acid, refined sugar, talc, hypromellose, polyvinyl acetal diethyl aminoacetate, polyvinyl alcohol (partially saponified), povidone, fumaric acid, carnauba wax

## 使用注意事項

### 禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故)

1. 以下情形者請勿服用。
  - (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
  - (2) 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥、感冒藥而引起氣喘的人
2. 服用本劑的期間，請勿服用以下醫藥品。  
其他感冒藥、鎮痛解熱藥、鎮靜藥、鎮咳去痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）、胃腸鎮痛鎮痙攣藥
3. 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類器具。（可能會引起嗜睡與視力模糊、感到異常刺眼等症狀）
4. 哺乳中的人請勿服用本劑，服用本劑時請避免哺乳。
5. 服用前後請勿飲酒。
6. 請勿長期連續服用。

### 使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
  - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
  - (2) 孕婦或有可能懷孕的人
  - (3) 高齡者
  - (4) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
  - (5) 有以下症狀的人  
發高燒、排尿困難
  - (6) 被診斷出患有以下疾病的人  
甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、青光眼、呼吸機能障礙、阻塞性睡眠呼吸暫停症候群、肥胖症