

日本制造

使用前请务必阅读本说明书。

同时应对此说明书进行妥善保管，以方便在必要时取阅。

有效缓解因咳嗽、痰而困扰的感冒

ルルアタック® CX

Lulu Attack® CX 感冒药

综合感冒药

指定第2类医药品



Lulu Attack CX 的特点

针对伴随难缠咳嗽及痰的感冒症状，含有磷酸双氢可待因、那可丁、消旋盐酸甲基麻黄碱、羧甲司坦等 9 种成分，发挥良好疗效的综合感冒药。


1. 作用于咳嗽中枢的 2 种镇咳成分——磷酸双氢可待因、那可丁，针对难止的咳嗽发挥良好疗效。
2. 消旋盐酸甲基麻黄碱舒张支气管舒缓呼吸，缓解难耐的咳嗽。
3. 祛痰成分羧甲司坦逐步化痰，让气管粘膜趋于正常，使造成咳嗽原因之一的痰更易排出。
4. 抗炎症成分布洛芬针对咽喉疼痛及发烧症状，抗组胺成分马来酸右氯苯那敏针对感冒的过敏症状（鼻涕、鼻塞等）发挥良好疗效。
5. 铝箔泡罩包装方便携带。

功能主治

缓解各类感冒症状（咳嗽、痰、咽喉疼痛、鼻涕、鼻塞、发烧、恶寒、打喷嚏、头痛、关节痛、肌肉疼痛）

用法及用量

请依照下述用量用凉水或温水送服。

| 年龄 | 1次用量 | 1天服用次数 |
|-------------|--|----------------------|
| 成年人（15岁及以上） | 2片  | 3次 尽量在餐后30分钟以内服用。 |
| 未满15岁 | | 请勿服用。 |

<用法及用量相关注意>

(1) 请严格遵守用法与用量。

(2) 片剂取出方法

如右图所示，用手指尖用力按压铝箔泡罩包装突起部，片剂会刺破铝箔，并将其取出。（若不慎连同包装一起误服，恐将导致包装刺伤食道粘膜等意外事故）

按压后取出



成分及分量

本品为白色薄膜衣片，每6片中含有以下成分。

| 成分 | 分量 | 作用 |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------|
| Ibuprofen | 450mg | 作用于炎症与疼痛原因的【前列腺素】，抑制咽喉疼痛等症状，退烧。 |
| Dihydrocodeine phosphate | 24mg | 作用于咳嗽中枢，镇咳。 |
| Noscapine | 48mg | |
| dl-methylephedrine hydrochloride | 60mg | 舒张支气管，镇咳。 |
| L-carbocysteine | 750mg | 让气管粘膜趋于正常，使造成咳嗽原因之一的痰更易排出。 |
| Glycyrrhizic acid | 39mg | 缓解咽喉、鼻部粘膜的炎症。 |
| d-chlorpheniramine maleate | 3.5mg | 抑制感冒的过敏症状（鼻涕、鼻塞等）。 |
| Anhydrous caffeine | 75mg | 缓解头痛。 |
| Benfotiamine (Vitamin B1 derivative) | 25mg | 促进恢复因感冒而消耗的体力。 |

添加剂: D-mannitol, cellulose, polyoxyethylene hydrogenated castor oil, croscarmellose sodium, hypromellose, hydroxypropyl cellulose, talc, silicic anhydride, polyvinyl alcohol (partial Saponified product), triethyl citrate, titanium oxide, carnauba wax

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

- 下述人群不要服用。
 - 因本品或本品成分出现过过敏症状的人群
 - 因服用本品或其他感冒药、解热镇痛药而引发过哮喘的人群
 - 未满15岁的儿童
 - 预产期在12周以内的孕妇
- 在服用本品期间，不要使用下述任何医药品。
其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等）
- 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类。
（可能会出现嗜睡症状）
- 处于哺乳期时不要服用本品，或在服用本品时不要进行哺乳。
- 服用前后不要饮酒。
- 不要连续服用超过5天。

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
 - 正在接受医师或牙科医师治疗的人群
 - 孕妇或有其可能性的人群
 - 老年人
 - 因药物等出现过过敏症状的人群
 - 拥有以下症状的人群：高烧、排尿困难
 - 接受以下诊断的人群：甲状腺功能障碍、糖尿病、心脏病、高血压、肝脏病、肾脏病、青光眼、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症
 - 患有以下疾病的人群：胃及十二指肠溃疡、溃疡性大肠炎、克隆氏病

保管及使用注意事项

- (1) 请避免阳光直射，保管在潮气小的阴凉处。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。
- (4) 请勿使用超过标注使用期限的产品。

有关本产品信息，请咨询购买其的药局或以下联系窗口。

第一三共医药保健株式会社 消费者服务窗口

邮 编 103-8234 东京都中央区日本桥 3-14-10

联系电话 0120-337-336

工作时间 9:00~17:00（周六、周日及节假日休息）

有关 Lulu 的详细信息请看 www.lulu.jp

01®注册商标

生产销售厂家

第一三共医药保健株式会社

东京都中央区日本桥 3-14-10

官网 <https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附属说明文件。