

能非常有效地缓解感冒时的咽喉痛和发烧

日本制造

ルルアタック® EX

Lulu Attack EX 感冒药

综合感冒药

指定第2類医薬品



功能主治

缓解各种感冒症状（咽喉痛、发烧、恶寒、头疼、流鼻涕、鼻塞、打喷嚏、咳嗽、有痰、关节疼痛、肌肉疼痛）

《Lulu Attack EX 适用于这些情况》



咽喉痛

发热

鼻塞流涕

咳嗽有痰

用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年龄	每次服用量	每天服用次数
成人（15岁以上）	2粒	每天3次，请尽量在餐后半小时内服用。
未满15岁		请勿服用。

〈使用注意〉

(1) 请严格遵守用法用量。

成分、分量

每6粒本品含有以下药效成分。

成分	分量
Tranexamic acid	750 mg
Ibuprofen	450 mg
Clemastine fumarate	1.34 mg (相当于 clemastine 1 mg)
Bromhexine hydrochloride	12 mg
<i>dl</i> -methylephedrine hydrochloride	60 mg
Dihydrocodeine phosphate	24 mg
Thiamine nitrate (Vitamin B1 nitrate)	25 mg
Riboflavin (Vitamin B ₂)	12 mg

添加剂: Trehalose, cellulose, macrogol, CMC-Na, polyvinyl alcohol(partially saponified), anhydrous silica, hydrogenated oil, magnesium stearate, hypromellose, titanium oxide, carnauba wax

〈有关成分、分量的注意事项〉

由于本品含有的核黄素（维生素 B₂），有时尿液会变黄色。

使用注意事项

禁忌事项

(违反禁忌事项，可能会使症状恶化或容易引发副作用及意外事故)

1. 下列人群请勿服用本品。

- (1) 曾因为服用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群
- (2) 曾因本品或其他感冒药、解热镇痛药而出现哮喘症状的人群
- (3) 未满 15 岁儿童
- (4) 预产期在 12 周以内的孕妇

2. 在服用本品期间，请不要使用下述的任何药品。

其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含有抗组胺药的内服药等（鼻炎用内服药、晕车药、过敏用药等）、含有氨甲环酸的内服药

3. 服用后，请不要驾驶车辆或操作机械类。（有时会出现困意等）

4. 正在哺乳期的人群请不要服用本品，如需服用时请避免哺乳。

5. 服用前后请勿饮酒。

6. 请不要服用本品 5 天以上。

需咨询

1. 下列人群在服用前，请事先咨询医生或药剂师。

- (1) 正在接受医生或牙科医生治疗的人群
- (2) 孕妇或可能怀孕中的人群
- (3) 高龄人群
- (4) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
- (5) 有下述症状的人群 高烧、排尿困难
- (6) 被诊断患有下述疾病的人群 甲状腺功能紊乱、糖尿病、心脏病、高血压、肝脏病、肾脏病、青光眼、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病、血栓人群（脑血栓形成、心肌梗死、静脉血栓形成）、可能引发血栓的人群、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症
- (7) 曾患过下列疾病的人群 胃 / 十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、克罗恩氏病