

對於喉嚨疼痛、發燒型感冒相當有效

日本製

# ルルアタック EX

## Lulu Attack EX 感冒藥

綜合感冒藥

指定第2類医薬品



### 效能與效果

舒緩感冒的各種症狀（喉嚨疼痛、發燒、發冷、頭痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、有痰、關節痛、肌肉痛）

《LULU ATTACKEX 可用於以下症狀》



喉嚨疼痛

發燒

流鼻水、鼻塞

咳嗽、有痰

### 用法與用量／使用方法

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

| 年齡        | 1次用量  | 1天服用次數                |
|-----------|-------|-----------------------|
| 成人(15歲以上) | 2錠    | 3次，<br>請儘量在飯後30分鐘內服用。 |
| 未滿15歲     | 請勿服用。 |                       |

<用法與用量相關注意事項>

(1) 請嚴格遵守用法與用量。

## 成分與份量

本劑每 6 錠中含有以下成分：

| 成 分                                      | 份 量                              |
|--|----------------------------------|
| Tranexamic acid                          | 750 mg                           |
| Ibuprofen                                | 450 mg                           |
| Clemastine fumarate                      | 1.34 mg<br>(相當於 clemastine 1 mg) |
| Bromhexine hydrochloride                 | 12 mg                            |
| <i>dl</i> -methylephedrine hydrochloride | 60 mg                            |
| Dihydrocodeine phosphate                 | 24 mg                            |
| Thiamine nitrate (Vitamin B1 nitrate)    | 25 mg                            |
| Riboflavin (Vitamin B2)                  | 12 mg                            |

添 加 物：Trehalose, cellulose, macrogol, CMC-Na, polyvinyl alcohol(partially saponified), anhydrous silica, hydrogenated oil, magnesium stearate, hypromellose, titanium oxide, carnauba wax  
< 成分與份量相關注意事項 >

本劑所含的核黃素（維生素 B<sub>2</sub>）可能會導致尿液變黃。

## 使用注意事項

### 禁止事項

（若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故）

- 以下情形者請勿服用。
  - 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
  - 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥、感冒藥而引起氣喘的人
  - 未滿 15 歲的兒童
  - 生產預定日期在 12 週以內的孕婦
- 服用本劑的期間，請勿服用以下醫藥品。  
其他感冒藥、鎮痛解熱藥、鎮靜藥、鎮咳去痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）、含有傳明酸的內服藥
- 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。（可能會引起嗜睡等症狀）
- 哺乳中的人請勿服用本劑，服用本劑時，請避免哺乳。
- 服用前後請勿飲酒。
- 請勿連續服用超過 5 天以上。

### 使用前需預先諮詢的人

- 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
  - 正在接受醫師或牙科醫師治療者
  - 孕婦或有可能懷孕的人
  - 高齡者
  - 曾對藥物等產生過敏症狀的人
  - 有以下症狀的人 發高燒、排尿困難
  - 被診斷出患有以下疾病的人  
甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、青光眼、係統性紅斑狼瘡、混合型結締組織疾病、血栓患者（腦血栓形成、心肌梗死、靜脈血栓形成等）、可能會引發血栓症的人、呼吸機能障礙、阻塞性睡眠呼吸暫停症候群、肥胖症
  - 曾患有以下疾病的人  
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性結腸炎、克羅恩氏病