

對於發燒型感冒及發冷型感冒相當有效

日本製

ルルアタック[®]FX^a

Lulu Attack FXa 感冒藥

綜合感冒藥



指定第2類医薬品

效能與效果

舒緩感冒的各種症狀（發燒、發冷、頭痛、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、咳嗽、有痰、關節痛、肌肉痛、打噴嚏）

用法與用量／使用方法

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1 次用量	1 天服用次數
成人（15 歲以上）	2 錠	3 次 請儘量在飯後 30 分鐘內服用。
7 歲以上未滿 15 歲	1 錠	
未滿 7 歲	請勿服用。	

< 用法與用量相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 讓 7 歲以上的兒童使用時，須有家長在旁指導監督。

成分、分量

本劑為白色的膜衣錠，每 6 錠含有以下成分

成分	份量
Isopropylantipyrine (pyrine medicine)	300 mg
Acetaminophen	450 mg
Powdered ginger	200 mg
Clemastine fumarate	1.34 mg
Glycyrrhizic acid	39 mg
Tipepidine hibenzate	75 mg
Noscapine	48 mg
dl-methylephedrine hydrochloride	60 mg
Anhydrous caffeine	75 mg
Ascorbic acid (Vitamin C)	300 mg

添加物：cellulose, hydroxypropyl cellulose, CMC-Na, corn starch, anhydrous silica, magnesium stearate, fumaric acid, stearic acid, polyvinyl acetal diethyl aminoacetate, hypromellose, talc, titanium oxide, macrogol, carnauba wax

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故)

1. 以下情形者請勿服用。
 - (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
 - (2) 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥、感冒藥而引起氣喘的人
2. 服用本劑的期間，請勿服用以下醫藥品。
其他感冒藥、鎮痛解熱藥、鎮靜藥、鎮咳去痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）
3. 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。（可能會引起嗜睡等症狀）
4. 服用前後請勿飲酒。
5. 請勿長期連續服用。

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
 - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - (2) 孕婦或有可能懷孕的人
 - (3) 哺乳中的人
 - (4) 高齡者
 - (5) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (6) 有以下症狀的人
發高燒、排尿困難
 - (7) 被診斷出患有以下疾病的人
甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、青光眼