

能非常有效地缓解鼻塞流涕等感冒症状

日本制造

ルルアタック[®] NX

Lulu Attack NX 感冒药

综合感冒药



指定第2類医薬品

功能主治

缓解各种感冒症状（流涕、鼻塞、咽喉痛、咳嗽、有痰、发烧、恶寒、打喷嚏、头痛、关节痛、肌肉痛）

用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

| 年齢 | 1次服用量 | 1天服用次数 |
|-----------|-------|-----------------|
| 成人（15岁以上） | 2粒 | 3次请尽量在餐后半小时内服用。 |
| 未满15岁 | 请勿服用。 | |

〈使用注意〉

(1) 请严格遵守用法用量。

成分、分量

本品为白色薄膜片剂,每六粒中含有以下药效成分。

| 成分 | 分量 |
|--|---------|
| Ibuprofen | 450 mg |
| Belladonna total alkaloids | 0.3 mg |
| Clemastine fumarate | 1.34 mg |
| Bromhexine hydrochloride | 12 mg |
| Dihydrocodeine phosphate | 24 mg |
| dl-methylephedrine hydrochloride | 60 mg |
| Anhydrous caffeine | 75 mg |
| Benfotiamine (vitamin B ₁ derivative) | 25 mg |
| Riboflavin (vitamin B ₂) | 12 mg |

添加剂: Corn starch, lactose, cellulose, CMC-Na, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, polyvinyl alcohol-acrylic acid-methyl methacrylate copolymer, talc, titanium oxide, hypromellose, carnauba wax

〈有关成分、分量的注意事项〉

由于本品含有的核黄素(维生素B₂),有时尿液会变黄色。

使用注意事项

禁忌事项

(违反禁忌事项, 可能会使症状恶化或容易引发副作用及意外事故)

1. 下列人群请勿服用本品。
 - (1) 曾因为服用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群
 - (2) 曾因本品或其他感冒药、解热镇痛药而出现哮喘症状的人群
 - (3) 未满 15 岁儿童
 - (4) 预产期在 12 周以内的孕妇
2. 在服用本品期间, 请不要使用下述的任何药品。
其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含有抗组胺药的内服药等 (鼻炎用内服药、晕车药、过敏用药等)、胃肠解痉止痛药
3. 服用后, 请不要驾驶车辆或操作机械类。(有时会出现困意, 视野模糊及感到异常的刺眼等症状)
4. 正在哺乳期的人群请不要服用本品, 如需服用时请避免哺乳。
5. 服用前后请勿饮酒。
6. 请不要服用本品 5 天以上。

需咨询

1. 下列人群在服用前, 请事先咨询医生或药剂师。
 - (1) 正在接受医生或牙科医生治疗的人群
 - (2) 孕妇或可能怀孕中的人群
 - (3) 高龄人群
 - (4) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
 - (5) 有下述症状的人群
高烧、排尿困难
 - (6) 被诊断患有下述疾病的人群
甲状腺功能紊乱、糖尿病、心脏病、高血压、肝脏病、肾脏病、青光眼、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症
 - (7) 曾患过下列疾病的人群
胃 / 十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、克罗恩氏病