

對於流鼻水、鼻塞型感冒相當有效

日本製

# ルルアタック<sup>®</sup> NX

Lulu Attack NX 感冒藥

綜合感冒藥



指定第2類医薬品

## 效能與效果

舒緩感冒的各種症狀（流鼻水、鼻塞、喉嚨疼痛、咳嗽、有痰、發燒、發冷、打噴嚏、頭痛、關節痛、肌肉痛）

## 用法與用量／使用方法

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1次用量	1天服用次數
成人（15歲以上）	2錠	3次請儘量在飯後30分鐘內服用。
未滿15歲	請勿服用。	

〈用法與用量相關注意事項〉

(1) 請嚴格遵守用法與用量。

## 成分與份量

本劑為白色的膜衣錠，每6錠含有以下成分：

成分	份量
Ibuprofen	450 mg
Belladonna total alkaloids	0.3 mg
Clemastine fumarate	1.34 mg
Bromhexine hydrochloride	12 mg
Dihydrocodeine phosphate	24 mg
dl-methylephedrine hydrochloride	60 mg
Anhydrous caffeine	75 mg
Benfotiamine (vitamin B <sub>1</sub> derivative)	25 mg
Riboflavin (vitamin B <sub>2</sub> )	12 mg

添加物：Corn starch, lactose, cellulose, CMC-Na, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, polyvinyl alcohol-acrylic acid-methyl methacrylate copolymer, talc, titanium oxide, hypromellose, carnauba wax

〈成分與份量相關注意事項〉

本劑所含的核黃素（維生素 B<sub>2</sub>）可能會導致尿液變黃。

## 使用注意事項

### 禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故)

1. 以下情形者請勿服用。
  - (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
  - (2) 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥、感冒藥而引起氣喘的人
  - (3) 未滿 15 歲的兒童
  - (4) 生產預定日期在 12 週以內的孕婦
2. 服用本劑的期間，請勿服用以下醫藥品。  
其他感冒藥、鎮痛解熱藥、鎮靜藥、鎮咳去痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）、胃腸鎮痛鎮痙藥
3. 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。（可能會引起嗜睡與視力模糊、感覺異常刺眼等症狀）
4. 哺乳中的人請勿服用本劑，服用本劑時請避免哺乳。
5. 服用前後請勿飲酒。
6. 請勿連續服用超過 5 天以上。

### 使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
  - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
  - (2) 孕婦或有可能懷孕的人
  - (3) 高齡者
  - (4) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
  - (5) 有以下症狀的人  
發高燒、排尿困難
  - (6) 被診斷出患有以下疾病的人  
甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、青光眼、係統性紅斑狼瘡、混合型結締組織疾病、呼吸機能障礙、阻塞性睡眠呼吸暫停症候群、肥胖症
  - (7) 曾患有以下疾病的人  
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性結腸炎、克羅恩氏病