

ルルアタック[®]TR

Lulu Attack TR感冒药

综合感冒药

指定第2類医薬品



功能主治

缓解各种感冒症状（咽喉痛、流鼻涕、鼻塞、打喷嚏、咳嗽、有痰、发烧、恶寒、头疼、关节疼痛、肌肉疼痛）

用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年齢	1次服用量	1天服用次数
成人（15岁以上）	2粒	1天2次，请尽量在早晚餐后半小时内服用。
未满15岁	请勿服用。	

〈使用注意〉

(1) 请严格遵守用法与用量。

成分、分量

本品为一半白色一半橘红色的胶囊，每4粒中含有以下药效成分。

成分	分量
Ibuprofen	400 mg
Glycyrrhizic acid	26 mg
Isopropamide iodide	5 mg
d-chlorpheniramine maleate	3.5 mg
Dextromethorphan hydrobromide hydrate	48 mg
dl-methylephedrine hydrochloride	60 mg
Anhydrous caffeine	75 mg

添加剂：D-mannitol, cellulose, CMC-Ca, hydroxypropyl cellulose, yellow 5, acrylic acid ethyl methyl methacrylate copolymer, talc, hypromellose, polyvinyl alcohol acrylic acid methyl methacrylate copolymer, silicon dioxide, sodium lauryl sulfate, gelatin

使用注意事项

禁忌事项

(违反禁忌事项, 可能会使目前的症状恶化或容易引发副作用及意外事故)

1. 下列人群请勿服用本品。

- (1) 曾因为服用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群
- (2) 曾因本品或其他感冒药、解热镇痛药而出现哮喘症状的人群
- (3) 未满15岁儿童
- (4) 预产期在12周以内的孕妇

2. 在服用本品期间, 请不要使用下述的任何药品。

其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含有抗组胺药的内服药等(鼻炎用内服药、晕车药、过敏用药等)、胃肠止痉止痛药

3. 服用后, 请不要驾驶机动车或操作机械类。(有时会出现困意, 视野模糊及感到异常的刺眼等症状)

4. 服用前后请勿饮酒。

5. 请不要服用本品5天以上。

需咨询

1. 下列人群在服用前, 请事先咨询医生或药剂师。

- (1) 正在接受医生或牙科医生治疗的人群
- (2) 孕妇或有可能怀孕的人群
- (3) 哺乳期妈妈
- (4) 高龄人群
- (5) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群

(6) 有下述症状的人群、
高烧、排尿困难

(7) 被诊断患有下述疾病的人群

甲状腺功能紊乱、糖尿病、心脏病、高血压、肝脏病、肾脏病、青光眼、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病

(8) 曾患过下列疾病的人群

胃溃疡、十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、克罗恩氏病