

用於舒緩喉嚨腫、喉嚨痛、口內炎

日本製

ペラック[®]T錠

PELACK T 錠

口腔咽喉藥



第3類医薬品

效能與效果

咽頭炎 / 扁桃炎（喉嚨腫、喉嚨痛）、口內炎

用法與用量 / 使用方法

請依下列份量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1 次用量	1 日服用次數
成人 (15 歲以上)	2 錠	3 次請分別於早午晚服用。
7 歲以上未滿 15 歲	1 錠	
未滿 7 歲	請勿服用。	

< 用法與用量相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 飯前或飯後皆可服用。
- (3) 讓 7 歲以上的兒童使用時，須有家長在旁指導監督。

成分與份量

本劑為淡黃色的膜衣錠，每 6 錠中含有以下的成分：

成分	份量
Tranexamic acid	750 mg
Powdered extract of glycyrrhiza	198 mg (相當於crude drug 990 mg)
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B ₆)	50 mg
Riboflavin (Vitamin B ₂)	12 mg
Sodium L-ascorbate (Vitamin C sodium)	500 mg

添加物：Cellulose, silicic anhydride, polyvinyl alcohol (partially saponified), corn starch, magnesium stearate, hypromellose, titanium oxide, talc, propylene glycol, dimethylpolysiloxane, silicon dioxide, iron sesquioxide, carnauba wax

< 成分與份量相關注意事項 >

- (1) 本劑所含的核黃素（維生素 B₂），可能會導致尿液變黃。
- (2) 服用本劑後，可能會對於尿液及糞便的檢查值造成影響。接受醫師的檢查時，請告知醫師正在服用含有維生素 C 製劑。

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用)

1. 服用本劑的期間，請勿服用以下任一種醫藥品。
 - (1) 含有甘草及其主要成分甘草酸的內服藥
(否則可能會導致水腫、血壓上升及肌肉疾病(肌肉病變)等)
 - (2) 含有抗凝血酸的內服藥
(鼻炎用內服藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮咳去痰藥等)
2. 請勿長期連續服用。

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
 - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - (2) 孕婦或有可能懷孕的人
 - (3) 高齡者
 - (4) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (5) 有以下症狀的人
水腫
 - (6) 被診斷出有以下疾病的人
高血壓、心臟病、腎臟病、血栓患者(腦血栓形成、心肌梗死、靜脈血栓形成等)、可能會引發血栓症的人