

使用前請務必閱讀本說明書。
並將其妥善保管，以便在日後需要時可隨時查閱。

針對痛苦的感冒症狀，早上服用療效持續至夜間。

プレコール® CR 持續性錠

Precol® CR 持續性錠

綜合感冒藥＜比林類＞

指定第 2 類醫藥品



PRECOL CR 持續性錠的特色

- 2種解熱鎮痛成分（異丙基安替比林、乙醯胺酚）以及7種有效成分均衡配方，對於喉嚨痛、發燒等痛苦的感冒症狀發揮綜合療效。
- 透過獨家的製藥技術(Control Release Technology)，實現在體內以2種不同溶解方式的藥劑膜層（速溶層與延釋層）。
- 1天2次，早、晚服用，易於服用的錠劑型綜合感冒藥。



效能與效果

舒緩感冒的各種症狀（喉嚨疼痛、發燒、流鼻水、鼻塞、咳嗽、有痰、發冷、頭痛、關節痛、肌肉痛、打噴嚏）

用法與用量/使用方法

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1次用量	1天服用次數
成人(15歲以上)	3錠	2次 (請盡量在早、晚飯後30分鐘內服用)
未滿15歲	請勿服用。	

＜用法與用量相關注意事項＞

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 錠劑的取出方式
如右圖所示，請用指尖用力按壓裝有錠劑的 PTP 包裝的凸起部分，擠破背面的鋁箔，取出錠劑後服用。
(若不慎連同包裝一起誤服，恐將導致刺穿食道黏膜等意外事故。)



成分與分量

本劑為白色的膜衣錠，每6錠中含有以下成分。

成分	分量	效果
Isopropylantipyrine (pyrene medicine)	300mg	退燒、舒緩喉嚨痛、頭痛、關節疼痛。
Acetaminophen	450mg	
Chlorpheniramine maleate	6mg	抑制流鼻水、鼻塞、打噴嚏。
Dihydrocodeine phosphate	18mg	止咳。
dl-methylephedrine hydrochloride	60mg	止咳、祛痰。
Powdered extract of glycyrrhiza	90mg (以生藥而言750mg)	抑制喉嚨與鼻黏膜的炎症。
Anhydrous caffeine	75mg	舒緩頭痛。

添加物：lactose, hydroxypropyl cellulose, cellulose, Magnesium stearate, hypromellose, methacrylic acid copolymer L, titanium oxide, macrogol, talc, stearic acid, carnauba wax.

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用及引起事故)

- 有以下情形者請勿服用。
 - 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
 - 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥、感冒藥而引發氣喘者
 - 未滿15歲的兒童
- 服用本劑的期間，請勿使用以下醫藥品。
其他感冒藥、鎮痛解熱藥、鎮靜藥、鎮咳去痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等(鼻炎用內服藥 暈車藥 過敏用藥等)
- 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。(可能會引起嗜睡等症狀)
- 哺乳中的人請勿服用本劑，服用本劑時請避免哺乳。
- 服用前後請勿飲酒。
- 請勿長期連續服用。

使用前需預先諮詢的人

- 有以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師或登錄販賣者諮詢。
 - 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - 孕婦或有可能懷孕者
 - 高齡者
 - 曾對藥物等產生過敏症狀者
 - 有以下症狀者：發高燒、排尿困難
 - 被診斷出患有以下疾病者：甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、青光眼、呼吸功能障礙、阻塞性睡眠呼吸暫停症候群、肥胖症

保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陽光直射不到，陰涼乾燥的地方。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。(可能會導致誤用或變質)
- (4) 請勿服用過期之藥品。

關於本藥品之諮詢，請洽詢購買之商店或以下聯絡窗口。

第一三共醫療保健株式會社 消費者服務專線

郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10

電話 0120-337-336

諮詢時間 9：00～17：00（週六、週日及國定假日除外）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®註冊商標

製造銷售商

第一三共醫療保健株式會社

東京都中央區日本橋 3-14-10

中国語（繁體中文）

2020.7 作成

以上資料僅供參考，詳情請參閱產品附屬說明文件。