

# 新ルル<sup>®</sup>-A錠<sub>s</sub>

## 新Lulu-A錠<sub>s</sub> 感冒藥

綜合感冒藥



指定第2類医薬品

### 效能與效果

舒緩感冒的各種症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、喉嚨疼痛、咳嗽、有痰、發冷、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛）

### 用法與用量／使用方法

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1次用量	1天服用次數
成人（15歲以上）	3錠	3次 請儘量在飯後30分鐘內服用。
12歲以上未滿15歲	2錠	
未滿12歲		請勿服用。

< 用法與用量相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 12歲以上兒童服用時，須有家長在旁指導監督。

### 成分與份量

本劑為白色的糖衣錠，每9錠含有以下成分：

成分	份量
Acetaminophen	900 mg
Clemastine fumarate	1.34 mg
Dihydrocodeine phosphate	24 mg
Noscapine	48 mg
<i>dl</i> -methylephedrine hydrochloride	60 mg
Guaiacol sulfonic acid potassium	240 mg
Anhydrous caffeine	75 mg
Benfotiamine (vitamin B <sub>1</sub> derivative)	24 mg

添加物: Cellulose, magnesium aluminometasilicate, CMC-Ca, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, gum arabic, titanium oxide, stearic acid, refined sugar, talc, hypromellose, polyvinyl acetal diethyl aminoacetate, polyvinyl alcohol (partially saponified), povidone, fumaric acid, carnauba wax

### 禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故)

1. 以下情形者請勿服用。

- (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
- (2) 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥、感冒藥而引起氣喘的人

2. 服用本劑的期間，請勿服用以下醫藥品。

其他感冒藥、鎮痛解熱藥、鎮靜藥、鎮咳去痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）

3. 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類器具。（可能會引起嗜睡等症狀）

4. 哺乳中的人請勿服用本劑，服用本劑時，請避免哺乳。

5. 服用前後請勿飲酒。

6. 請勿長期連續服用。

### 使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。

- (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
- (2) 孕婦或有可能懷孕的人
- (3) 高齡者
- (4) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
- (5) 有以下症狀的人

發高燒、排尿困難

(6) 被診斷出患有以下疾病的人

甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、青光眼、呼吸機能障礙、阻塞性睡眠呼吸暫停症候群、肥胖症