

有效缓解难受的口腔溃疡及咽喉肿痛

日本制造

トラフル錠

Traful 口腔溃疡片剂

口腔咽喉用药

第3类医薬品



功能主治

口腔溃疡、咽喉炎、扁桃体炎（喉咙肿、喉咙痛）

用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年齢	1次服用量	1天服用次数
成人（15岁以上）	2粒	3次 请在早中晚各服用1次。
7岁以上、未滿15岁	1粒	
未滿7岁	请勿服用。	

〈使用注意〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 餐前餐后皆可服用。
- (3) 让7岁以上的儿童服用时，需在家长的监督指导下服用。

成分、分量

本品为淡黄色的薄膜片剂，每六粒中含有以下成分。

成分	分量
Tranexamic acid	750 mg
Powdered extract of glycyrrhiza	198 mg (相当于 crude drug 990 mg)
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B ₆)	50 mg
Riboflavin (Vitamin B ₂)	12 mg
Sodium L-ascorbate (Vitamin C sodium)	500 mg

添加剂：Cellulose, silicic anhydride, polyvinyl alcohol (partially saponified), corn starch, stearic acid Mg, hypromellose, titanium oxide, talc, propylene glycol, dimethylpolysiloxane, silicon dioxide, iron sesquioxide, carnauba wax

〈有关成分、分量的注意事项〉

- (1) 由于本品含有的核黄素（维生素 B₂），有时尿液会变黄色。
- (2) 服用本品可能会对尿液及粪便检查结果产生影响。在医院进行检查时，请提前告知医生正在服用含有维生素 C 的制剂。

禁忌事项

(如违反禁忌事项, 容易引起症状恶化或引发副作用)

1. 在服用本品期间, 请不要使用下述的任何药品。
 - (1) 甘草或主要成分是甘草酸的口服药
(可能会引发水肿、血压上升、肌肉病变等问题)
 - (2) 含有氨甲环酸的口服药
(如鼻炎用口服药、感冒药、退热止疼药、镇咳祛痰药等)
2. 请勿长期连续服用本品。

需咨询

1. 下列人群在服用前, 请事先咨询医生或药剂师。
 - (1) 正在接受过医生或牙科医生治疗的人群
 - (2) 孕妇或可能怀孕中的人群
 - (3) 高龄人群
 - (4) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
 - (5) 有下述症状的人群
水肿
 - (6) 被诊断有下述疾病的人群
高血压、心脏病、肾脏病、血栓人群(脑血栓形成、心肌梗死、静脉血栓形成)、可能引发血栓的人群