

トラフル® クリアウォッシュ

Traful 漱口液

漱口藥

第3類醫藥品



效能與效果

口腔及咽喉の紅腫、殺菌、消毒、清潔、消除口臭

用法與用量／使用方法

每次取本品 0.4mL，用 100mL 的水或溫水稀釋後使用，1 日使用數次

成分與份量（每 100mL）

成分	份量
偶氮磺酸鹽鈉水合物	0.5g
氯化十六烷吡啶單水合物	1.25g

添加物：L-薄荷醇、檸檬酸鈉、檸檬酸、磷酸氫鈉、乙醇、甘油

使用注意事項

使用前需預先諮詢的人

- 以下人群服用前請諮詢醫生、牙醫、藥劑師或藥物登記銷售員。
 - 正在接受醫生或牙醫治療的人群
 - 曾出現因藥物等引起過敏症狀的人群
 - 出現以下症狀的人群：口腔內嚴重潰瘍
- 使用後出現的以下症狀有可能是本藥副作用，如出現應立即停止使用，出示外包裝盒向醫生、牙醫、藥劑師或藥物登記銷售員進行諮詢。

關聯部位	症狀
皮膚	發疹・發紅、瘙癢
口腔	刺激感

- 使用 5 ~ 6 天症狀無好轉時，停止使用，出示外包裝盒向醫生、牙醫、藥劑師或藥物登記銷售員進行諮詢。