

トラフル[®]軟膏PROクイック

Traful 軟膏 PRO Quick

口內炎治療藥




指定第2類医薬品

效能與效果

口內炎（復發性）

本劑的治療對象為「口內炎（復發性）」，口內炎是口腔炎症的總稱，也就是如下圖般在臉頰內側與舌頭、嘴唇內側等處，出現周圍發紅、中央部位有淺淺的白色圓形凹陷，伴隨著微微疼痛感的小型潰瘍（直徑不到 10mm），數量為 1～數個不等。



用法與用量／使用方法

每天 1 次或數次，適量塗抹於患部。

< 用法與用量相關注意事項 >


- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 讓兒童使用時，須有家長在旁指導監督。
- (3) 僅限使用於口腔，禁止使用於口腔以外的部位。
- (4) 緩解症狀之後請停止使用
- (5) 塗抹之後一段時間，請儘量避免進食。
- (6) 請勿使用于假牙粘合等治療以外的目的。

Traful 軟膏 PRO Quick 的使用方法

1. 使用本劑之前，請先漱口保持清潔。
2. 請將本劑塗抹覆蓋住患部。
3. 塗抹之後，請儘量避免接觸到患部。

< 軟管開封方法 >

請將上蓋逆向對準軟管封口，利用突起部位用力刺入軟蓋封口以進行開封。



成分與份量

本劑為白色～淡黃色的軟膏，每 100g 中含有以下成分：

成分	份量
Triamcinolone acetonide	0.1g

添加物：Glycerin, gelatinized hydrocarbon, sodium polyacrylate, hypromellose, Hardened oil, Cellulose gum, l-menthol, sodium saccharate

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或是容易發生副作用)

1. 下列情形者請勿使用：

(1) 疑似屬於感染性的口內炎患者 (請向醫師、牙科醫師或藥劑師諮詢)

- 口腔各處有白斑者 (疑似為念珠菌感染症)
- 患部有黃色膿胞者 (疑似為細菌感染症)
- 口腔內有許多米粒~黃豆般大小的水泡者、口腔黏膜以外的口唇或皮膚亦有水泡、起疹者 (疑似為病毒感染症)
- 出現發熱、食慾不振、全身倦怠感、淋巴節腫脹等全身症狀者 (疑似為病毒感染症)

(2) 口腔內伴隨著感染現象者

(由於曾有使用類固醇劑而導致感染症惡化的報告，請勿使用於齒槽膿漏、齒肉炎等口腔內部感染的部位)

(3) 持續使用 5 天後仍未改善症狀者

(4) 使用 1 ~ 2 天後症狀惡化者

使用前需預先諮詢的人

1. 下列情形者，使用前請先向醫師、牙科醫師、藥劑師諮詢。

- (1) 正在接受醫師或牙科醫師診療者
- (2) 孕婦或可能懷孕者
- (3) 哺乳中的人
- (4) 高齡者
- (5) 曾對藥物等產生過敏症狀者
- (6) 患部範圍較大者