

通过氨甲环酸改善肝斑

日本制造

TRANSINO トランシーノ® II

Transino II 肝斑治疗药

色斑(仅针对肝斑)治疗药



第1類医薬品

功能主治

色斑 (仅针对肝斑)

用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年齢	1次服用量	1天服用次数
成人 (15岁以上)	2粒	2次 请在餐后服用。
未满15岁	请勿服用。	

〈使用注意〉

(1) 请严格遵守用法用量。

其他注意事项

- 请不要连续服用本品2个月以上。但请至少服用1个月左右，才能看出本品的疗效。
- 停药后如再次出现肝斑，请在间隔至少2个月以后再继续服用本品。再次开始服药后，也请不要连续服用本品2个月以上。

成分、分量

每4粒中含有以下药效成分。

成分	分量
Tranexamic acid	750 mg
L-cysteine	240 mg
Ascorbic acid (vitamin C)	300 mg
Pyridoxine hydrochloride (vitamin B ₆)	6 mg
Calcium pantothenate	24 mg

添加剂: calcium lactate, crystalline cellulose, croscarmellose Na, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, hypromellose, macrogol, talc, titanium oxide, iron sesquioxide, carnauba wax

〈有关成分、分量的注意事项〉

服用本品可能会对尿液及粪便检查结果产生影响。

在医院进行检查时，请提前告知医生正在服用含有维生素C的制剂。

禁忌事项

(违反禁忌事项, 可能会使症状恶化或容易引发副作用及意外事故)

1. 下列患者请勿服用本品。
 - (1) 曾因为服用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的患者
 - (2) 曾因服用本品或其他感冒药、解热镇痛药出现哮喘症状的患者
2. 服用本品期间, 请不要服用下述药品。
其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含有抗组胺药的内服药等(鼻炎用内服药、晕车药、过敏用药等)、胃肠解痉止痛药、含有氨甲环酸的内服药
3. 服用后, 请不要驾驶操作车辆或机械。(可能会诱发困意, 出现视野模糊及感觉到异常的刺眼强光等症状)
4. 正在哺乳期的患者请不要服用本品, 或是服用后不要进行哺乳。
5. 服用前后请勿饮酒。
6. 请勿长期服用本品。

需遵医嘱的情况

1. 下列患者在服用前, 请前往咨询医生、药剂师。
 - (1) 正在接受医生或牙科医生治疗的患者
 - (2) 正在孕期或备孕中的患者
 - (3) 高龄患者
 - (4) 曾出现药物过敏等过敏反应的患者
 - (5) 出现下述症状的患者
高烧、排尿困难
 - (6) 被诊断患有下述疾病的患者
甲状腺功能障碍、糖尿病、心脏病、高血压、肝脏病、肾脏病、胃十二指肠溃疡、青光眼、血栓患者(脑血栓、心肌梗塞、血栓性静脉炎)、可能引发血栓的患者