

TRANSINO トランシーノ® II

Transino II

黑斑(僅限於肝斑)改善藥



第1類医薬品

效能與效果

黑斑（僅限於肝斑）

用法與用量／使用方法

請以下列份量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1 次用量	1 日服用次數
成人（15 歲以上）	2 錠	2 次 請於飯後服用。
未滿 15 歲		請勿服用。

< 用法與用量相關注意事項 >

(1) 請嚴格遵守用法與用量。

其他注意事項

- 請勿持續服用超過 2 個月以上，但為了瞭解藥品效果，建議連續服用約 1 個月左右。
- 停止服用後，若再次發生症狀時，可以再次服用，但距離前一次的停藥，請至少間隔 2 個月以上。此外，再次開始服用之後，亦請勿持續服用超過 2 個月以上。

成分與份量

本劑每 4 錠中含有以下成分：

成分	份量
Tranexamic acid	750 mg
L-cysteine	240 mg
Ascorbic acid (vitamin C)	300 mg
Pyridoxine hydrochloride (vitamin B ₆)	6 mg
Calcium pantothenate	24 mg

添加物：calcium lactate, crystalline cellulose, croscarmellose Na, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, hypromellose, macrogol, talc, titanium oxide, iron sesquioxide, carnauba wax

< 成分與份量相關注意事項 >

服用本劑後，可能會對於尿液及糞便的檢查值造成影響。接受醫師的檢查時，請告知醫師正在服用含有維生素 C 的製劑。

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用)

1. 以下情形者請勿服用。
正在接受透析治療的人 (可能會引發痙攣)
2. 服用本劑的期間，請勿服用以下醫藥品。
含有抗凝血酸的內服藥

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
 - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - (2) 孕婦或有可能懷孕的人
 - (3) 哺乳中的人
 - (4) 55 歲以上的人
 - (5) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (6) 有血栓症的人 (腦血栓形成、心肌梗死、靜脈血栓形成、肺栓塞等)
 - (7) 可能會發生血栓症的人 (以前曾發生過血栓症的人、家族史有血栓症的人、曾獲醫師告知有先天性凝血異常症的人、正在服用口服避孕藥或補充荷爾蒙等可能會引起血栓症之藥品的人)
 - (8) 被診斷出患有以下疾病的人
腎臟疾病