

用於減緩色斑、雀斑、日曬、斑疹所引起的色素沉澱

日本製

TRANSINO WhiteC clear

トランシーノ ホワイトCクリア

TRANSINO® White C clear

維他命 C 主藥製劑

第 3 類非處方藥



效能與效果

1. 用於減緩以下各種症狀：色斑、雀斑、日曬・斑疹所引起的色素沉澱。
 2. 針對以下情形補充維他命 C：身體疲勞時、懷孕 / 哺乳期、病中 / 病後體力衰弱時、老年期。
 3. 用於預防以下情形時的出血症狀：牙齦出血、流鼻血。
- 「關於上述 1 及 3 的症狀，使用 1 個月左右仍未改善時，請向醫師、藥劑師或牙科醫師諮詢」。

用法與用量 / 使用方法

請以下列份量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1 次用量	1 日服用次數
成年人 (15 歲以上)	2 錠	2 次 請於早晚服用。
7 歲以上 ~ 未滿 15 歲	1 錠	
未滿 7 歲	請勿服用。	

< 用法與用量相關的注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 飯前、飯後均可服用。
- (3) 7 歲以上兒童服用時，須有家長在旁指導監督。

成分與份量

本劑為淡白色 ~ 白色的膜衣錠，每 4 錠內含有以下成分。

抗壞血酸 (維他命 C)	1000mg
L- 半胱氨酸	240mg
琥珀酸右旋維他命 E (天然型維他命 E)	50mg
核黃素 (維他命 B ₂)	6mg
吡哆素 (維他命 B ₆)	12mg
煙酸酰胺 (維他命 B ₃)	60mg

添加物：玉米澱粉、乳糖、纖維素、羧甲基纖維素、羥丙基纖維素、硬脂酸鎂、羥丙甲纖維素、氧化鈦、滑石粉、聚乙二醇、棕櫚蠟

< 成分與份量相關注意事項 >

- (1) 服用本劑後，可能會對於尿液及糞便的檢查值造成影響。接受醫師的檢查時，請告知醫師正在服用含有維他命 C 的製劑。
- (2) 本劑所含的核黃素 (維他命 B₂) 可能會導致尿液變黃。

使用注意事項

需諮詢的情況

1. 有以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師或登記合格的銷售商諮詢。
 - (1) 正在接受醫師治療的人
 - (2) 曾發生藥物過敏等症狀的人