

淡化色斑、雀斑、日晒、皮疹造成的色素沉淀。

日本制造

TRANSINO WhiteC clear

トランシーノ ホワイトCクリア

TRANSINO® White C clear

维他命C主药制剂

第3类非处方药



功能主治

1. 缓解以下症状：色斑、雀斑、日晒、皮疹造成的色素沉淀。
 2. 针对以下情况需要补充维他命C：身体疲劳时、孕期、哺乳期、病中、病愈后体力低下时、老年期。
 3. 预防以下症状：牙龈出血、流鼻血。
- “关于上述1及3的症状，如使用本品1个月左右仍未得到改善，请咨询医生、药剂师或牙科医生。”

用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年齢	1次用量	每天服用次数
成年人（15岁以上）	2片	2次 请在早晚各服用一次。
7岁以上～未满15岁	1片	
未满7岁	请勿服用。	

〈关于用法与用量方面的注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法与用量。
- (2) 饭前、饭后均可服用。
- (3) 7岁以上儿童需在监护人的监督指导下服用本品。

成分、分量

本品为淡白色～白色膜衣片，每四片中含以下药效成分。

抗坏血酸（维他命C）	1000mg
L-半胱氨酸	240mg
d-α-琥珀酸酯维他命E（天然型维他命E）	50mg
核黄素（维他命B ₂ ）	6mg
盐酸吡哆辛（维他命B ₆ ）	12mg
烟酰胺（维他命B ₃ ）	60mg

添加剂：玉米淀粉、乳糖、纤维素、羧甲基纤维素、羟丙基纤维素、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素、氧化钛、滑石粉、聚乙二醇、棕榈蜡

〈关于成分与用量方面的注意事项〉

- (1) 服用本品可能会对尿液及粪便检查结果产生影响。在医院进行检查时，请提前告知医生正在服用含有维他命C的制剂。
- (2) 本品加入的核黄素（维他命B₂）可能会导致尿液颜色变黄。

需遵医嘱的情况

1 下列患者在服用前，请咨询医生、药剂师或授权药房。

- (1) 正在接受医生治疗的患者
- (2) 曾出现药物过敏等过敏反应的患者