

医薬品を正しく購入するための  
説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 名称                                | エージーアレルカット(is/ic/im)  |
| 2 | 成分・分量                             | 100mL 中<br>クロモグリク酸ナトリウム 1g、クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.015g、<br>グリチルリチン酸二カリウム 0.125g、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 0.2g<br>※添加物は外箱、添付文書を参照   |
| 3 | 用法・用量                             | 1回 1～2滴、1日 4～6回点眼して下さい。<br><br><用法・用量に関連する注意><br>容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。<br>また、混濁したものは使用しないで下さい。<br>コンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。<br>(※imのみ)本剤はとろみのある薬液のため、点眼後、しばらく視野がぼやけることが<br>ありますので注意して下さい。  |
| 4 | 効能・効果                             | 花粉、ハウスダスト(室内塵)等による次のような目のアレルギー症状の緩和：<br>目のかゆみ、目の充血、目のかすみ(目やにの多いとき等)、なみだ目、<br>異物感(コロコロする感じ)  |
| 5 | 保健衛生上の<br>危害を防止<br>するために<br>必要な事項 | 1. 次の人は使用しないで下さい。<br>本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>2. 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。<br><br>次に該当する人はお申し出下さい。<br>(1)医師の治療を受けている人<br>(2)減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人<br>(3)妊婦又は妊娠していると思われる人<br>(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>(5)次の症状のある人：はげしい目の痛み<br>(6)次の診断を受けた人：緑内障<br>(7)アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人<br>特に次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に<br>相談して下さい。<br>●片方の目だけに症状がある場合<br>●目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合<br>●視力にも影響がある場合 |
| 6 | 薬剤師または<br>登録販売者が<br>必要と判断<br>する事項 |   |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。