

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名称	クラリチンEX
2	成分・分量	1錠中 ロラタジン 10mg ※添加物は外箱を参照
3	用法・用量	次の量を1日1回、食後に水又はお湯服用してください。 また毎回同じ時間帯に服用してください。 成人（15歳以上）：1錠 15歳未満 服用しないでください。
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和： 鼻みず、鼻づまり、くしゃみ
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	- 次の人は服用しないでください。 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 15歳未満の小児 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、 催眠鎮静薬等）、エリスロマイシン、シメチジン - 服用前後は飲酒しないでください。 - 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 次に該当する人はお申し出ください。 - 医師の治療を受けている人 - 妊婦又は妊娠していると思われる人 - 高齢者 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 - 次の診断を受けた人 肝臓病、腎臓病、てんかん - 次の病気にかかったことがある人 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎などの他のアレルギー疾患 - アレルギー性鼻炎か、かぜなど他の原因によるものかわからない人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。