

使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃腸薬

第2類医薬品 胃のもたれ・むかつき・不快感に スーッととけて効く

第一三共胃腸薬細粒s

第一三共胃腸薬細粒sの特徴

次のようなはたらきをもった薬剤で、胃のもたれ・むかつき・不快感などにお使いいただけます。

- 脂肪消化酵素リパーゼAP12と消化酵素タカジアスターゼN1が、消化を助けます。
- 6種の健胃成分が弱った胃のはたらきを高め、胃の不快感・食欲不振などに効きめをあらわします。
- 生薬アカメガシワ、カンゾウ末が胃粘膜のあれ・ただれを修復し、3種の制酸剤が胃酸を中和することで、胃痛の原因を抑えます。
- ナトリウムを配合していないので、塩分が気になる方でも服用できます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 次の診断を受けた人
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

便秘、下痢

4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- もたれ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸つかえ、食欲不振
- 胸やけ、胃痛、胃酸過多、胃重、胃部不快感、げっぷ
- 消化不良、消化促進、胃弱、胃部・腹部膨満感
- はきけ（むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐



もたれに



むかつきに



胃部不快感に



胃痛に

用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|------------|------------|-------------------|
| 15歳以上 | 1包 | 3回 食後に服用して下さい。 |
| 11歳以上15歳未満 | 2/3包 | |
| 8歳以上11歳未満 | 1/2包 | |
| 5歳以上8歳未満 | 1/3包 | |
| 3歳以上5歳未満 | 1/4包 | |
| 3歳未満 | 服用しないで下さい。 | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 3歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

本剤は、白色～わずかに黄褐色を帯びた白色の顆粒及び淡褐色～褐色の顆粒の混合物で、3包（1包1.3g）中に次の成分を含有しています。

| 成分 | 分量 | はたらき |
|--------------------|--------------------------|--|
| タカヂアスターゼN1 | 150mg | 広いpH域ではたらく消化酵素で、消化を助け、栄養の吸収をよくします。 |
| リパーゼAP12 | 60mg | 脂肪消化酵素で、消化作用をあらわします。 |
| アカメガシワエキス | 63mg (アカメガシワとして504mg) | 胃腸の過度の緊張をおさえて、胃粘膜を保護し、胃の炎症をしずめます。 |
| カンゾウ末 | 150mg | |
| ケイ酸アルミン酸 マグネシウム | 1200mg | 持続的な制酸作用を有し、かつ胃粘膜の炎症面を保護するはたらきもあります。また、合成ヒドロタルサイトは速効性もかねそなえています。 |
| 合成ヒドロタルサイト | 450mg | |
| 水酸化マグネシウム | 600mg | 速効的な制酸作用を有し、胸やけ、げっぷなどの過酸症状を改善します。 |
| オウバク末 | 105mg | |
| ケイヒ末 | 225mg | |
| ウイキョウ末 | 60mg | 味や香りによって味覚を刺激し、胃液や消化液の分泌を調節し、消化を助けます。 |
| チョウジ末 | 30mg | |
| ショウキョウ末 | 75mg | |
| l-メントール | 9mg | |

添加物：セルロース、乳糖、ポリソルベート80、ヒドロキシプロピルセルロース、サンショウ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

02

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50